

신기후체제 대비
충청북도
기후변화
전망보고서

발간번호 11-1360000-001446-01



기상청
Korea Meteorological
Administration

목차

제1장 서론	8	제3장 기후변화 전망	19
1. 지리적 특성	8	1. 기온 및 강수량	19
2. 관측 자료 소개	9	1) 평균기온	19
3. 고해상도 시나리오 소개	10	2) 일최고기온	22
4. 극한기후지수 정의	12	3) 일최저기온	30
5. 응용정보 정의	13	4) 연강수량	38
6. 계절길이 정의	13	2. 극한기후지수	44
		1) 극한기온지수	44
		2) 극한강수지수	68
제2장 최근 10년 기후특성	14	3. 계절길이	84
1. 기온	14		
2. 강수량	16		
3. 기타 요소	18	제4장 분야별 응용정보	85
		1. 에너지(냉방도일, 난방도일)	85
		2. 보건(열지수, 불쾌지수)	90
		3. 농업(생육도일, 유효적산온도)	96
		제5장 결론	102

- 기후변화 시나리오는 '기후정보포털' 누리집(www.climate.go.kr)에서 제공하고 있습니다.

- 시나리오 소개 RCP 시나리오
- 시나리오 조회 전지구, 한반도, 남한상세(양상블), 극한기후지수
- 응용시나리오 조회 농업, 방재, 보건, 수자원, 산림분야 응용정보
- 시나리오 요청/ 다운로드 전지구, 한반도, 남한상세, 극한기후지수, 행정구역별 자료, 부분별 응용정보
회원 가입 후 신청서를 작성하여 요청, 기상청 승인 후 다운로드 가능



공공누리 저작물 표시

본 보고서의 내용 사용시 출처를 표시해야 하며 비영리 목적으로만 이용할 수 있습니다.

표목차

- 10 표 1-1 RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO₂ 농도
12 표 1-2 기온 및 강수 관련 극한기후지수의 정의
13 표 1-3 농업, 보건, 에너지분야 응용정보의 정의
13 표 1-4 계절 시작일과 계절길이 정의
15 표 2-1 충청북도의 일평균·최고·최저기온 및 극한기후지수(2001~2010년)
17 표 2-2 충청북도의 계절 및 연강수량과 극한기후지수(2001~2010년)
18 표 2-3 충청북도의 기온 관련 극한기후지수(2001~2010년)
20 표 3-1 충청북도 연평균기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
20 표 3-2 충청북도 연평균기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
20 표 3-3 충청북도의 계절별 평균기온 전망(°C)
24 표 3-4 충청북도 연평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
24 표 3-5 충청북도 연평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
26 표 3-6 충청북도 여름철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
26 표 3-7 충청북도 여름철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
28 표 3-8 충청북도 겨울철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
28 표 3-9 충청북도 겨울철 평균 일최고기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
32 표 3-10 충청북도 연평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
32 표 3-11 충청북도 연평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
34 표 3-12 충청북도 여름철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
34 표 3-13 충청북도 여름철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
36 표 3-14 충청북도 겨울철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP2.6)
36 표 3-15 충청북도 겨울철 평균 일최저기온 전망의 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP6.0)
40 표 3-16 충청북도 연강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP2.6)
41 표 3-17 충청북도 연강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP6.0)
46 표 3-18 충청북도의 폭염일수(일) 전망(RCP2.6)
46 표 3-19 충청북도의 폭염일수(일) 전망(RCP6.0)
48 표 3-20 충청북도의 열대야일수(일) 전망(RCP2.6)
48 표 3-21 충청북도의 열대야일수(일) 전망(RCP6.0)
52 표 3-22 충청북도의 서리일수(일) 전망(RCP2.6)
52 표 3-23 충청북도의 서리일수(일) 전망(RCP6.0)
54 표 3-24 충청북도의 결빙일수(일) 전망(RCP2.6)
54 표 3-25 충청북도의 결빙일수(일) 전망(RCP6.0)
58 표 3-26 충청북도의 식물성장가능기간(일) 전망(RCP2.6)
58 표 3-27 충청북도의 식물성장가능기간(일) 전망(RCP6.0)

표목차

- 60 표 3-28 충청북도의 여름일수(일) 전망(RCP2.6)
60 표 3-29 충청북도의 여름일수(일) 전망(RCP6.0)
64 표 3-30 충청북도의 일교차(°C) 전망(RCP2.6)
64 표 3-31 충청북도의 일교차(°C) 전망(RCP6.0)
66 표 3-32 충청북도의 한파일수(일) 전망(RCP2.6)
66 표 3-33 충청북도의 한파일수(일) 전망(RCP6.0)
70 표 3-34 충청북도의 강수강도(mm/일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP2.6)
71 표 3-35 충청북도의 강수강도(mm/일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP6.0)
72 표 3-36 충청북도의 호우일수(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP2.6)
73 표 3-37 충청북도의 호우일수(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP6.0)
78 표 3-38 충청북도의 5일최다강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP2.6)
79 표 3-39 충청북도의 5일최다강수량(mm) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP6.0)
80 표 3-40 충청북도의 최대무강수지속기간(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP2.6)
81 표 3-41 충청북도의 최대무강수지속기간(일) 전망과 현재 기후값 대비 변화율%(%) (RCP6.0)
84 표 3-42 충청북도의 계절길이(계절시작일) 변화 전망
86 표 4-1 충청북도의 냉방도일(도일) 전망(RCP2.6)
86 표 4-2 충청북도의 냉방도일(도일) 전망(RCP6.0)
88 표 4-3 충청북도의 난방도일(도일) 전망(RCP2.6)
88 표 4-4 충청북도의 난방도일(도일) 전망(RCP6.0)
91 표 4-5 열지수 기준범위
91 표 4-6 불쾌지수 기준범위
92 표 4-7 충청북도의 열지수 전망(RCP2.6)
92 표 4-8 충청북도의 열지수 전망(RCP6.0)
94 표 4-9 충청북도의 불쾌지수 전망(RCP2.6)
94 표 4-10 충청북도의 불쾌지수 전망(RCP6.0)
97 표 4-11 작물별 생육도일 및 유효적산온도
98 표 4-12 충청북도의 10°C 기준 생육도일(도일) 전망(RCP2.6)
98 표 4-13 충청북도의 10°C 기준 생육도일(도일) 전망(RCP6.0)
100 표 4-14 충청북도의 10°C 기준 유효적산온도(°C) 전망(RCP2.6)
100 표 4-15 충청북도의 10°C 기준 유효적산온도(°C) 전망(RCP6.0)
105 표 5-1 충청북도의 기후요소별 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 편차(RCP2.6)
105 표 5-2 충청북도의 기후요소별 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 편차(RCP6.0)
106 표 5-3 충청북도의 시나리오별(RCP2.6/RCP4.5/RCP6.0/RCP8.5) 기후요소 전망

그림목차

- 8 그림 1-1 충청북도의 행정구역 구분과 관측 지점의 위치
- 11 그림 1-2 고해상도 시나리오 자료 산출 과정
- 14 그림 2-1 충청북도의 시군별 연평균기온(°C) 분포도(2001~2010년)
- 16 그림 2-2 충청북도의 시군별 연강수량(mm) 분포도(2001~2010년)
- 19 그림 3-1 충청북도에서 연평균기온(°C) 상승율이 가장 큰 지역(단양군)과 작은 지역(청주시)의 시계열
- 21 그림 3-2 충청북도의 시군별 연평균기온(°C) 전망 분포도
- 25 그림 3-3 충청북도의 시군별 연평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 27 그림 3-4 충청북도의 시군별 여름철 평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 29 그림 3-5 충청북도의 시군별 겨울철 평균 일최고기온(°C) 전망 분포도
- 33 그림 3-6 충청북도의 시군별 연평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 35 그림 3-7 충청북도의 시군별 여름철 평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 37 그림 3-8 충청북도의 시군별 겨울철 평균 일최저기온(°C) 전망 분포도
- 39 그림 3-9 충청북도에서 연강수량(mm) 증가율이 가장 큰 지역(영동군)과 작은 지역(진천군)의 시계열
- 42 그림 3-10 충청북도의 시군별 연강수량(mm) 전망 분포도
- 43 그림 3-11 충청북도의 시군별 연강수량 변화율%(2001~2010년 대비) 전망 분포도
- 47 그림 3-12 충청북도의 시군별 폭염일수(일) 전망 분포도
- 49 그림 3-13 충청북도의 시군별 열대야일수(일) 전망 분포도
- 53 그림 3-14 충청북도의 시군별 서리일수(일) 전망 분포도
- 55 그림 3-15 충청북도의 시군별 결빙일수(일) 전망 분포도

그림목차

- 59 그림 3-16 충청북도의 시군별 식물성장가능기간(일) 전망 분포도
- 61 그림 3-17 충청북도의 시군별 여름일수(일) 전망 분포도
- 65 그림 3-18 충청북도의 시군별 일교차($^{\circ}\text{C}$) 전망 분포도
- 67 그림 3-19 충청북도의 시군별 한파일수(일) 전망 분포도
- 74 그림 3-20 충청북도의 시군별 강수강도($\text{mm}/\text{일}$) 전망 분포도
- 75 그림 3-21 충청북도의 시군별 호우일수(일) 전망 분포도
- 82 그림 3-22 충청북도의 시군별 5일최다강수량(mm) 전망 분포도
- 83 그림 3-23 충청북도의 시군별 최대무강수지속기간(일) 전망 분포도
- 85 그림 4-1 충청북도의 월별 냉방도일(도일) 전망
- 85 그림 4-2 충청북도의 월별 난방도일(도일) 전망
- 87 그림 4-3 충청북도의 시군별 냉방도일(도일) 전망 분포도
- 89 그림 4-4 충청북도의 시군별 난방도일(도일) 전망 분포도
- 93 그림 4-5 충청북도의 시군별 열지수 전망 분포도
- 95 그림 4-6 충청북도의 시군별 불쾌지수 전망 분포도
- 99 그림 4-7 충청북도의 시군별 생육도일(10°C)(도일) 전망 분포도
- 101 그림 4-8 충청북도의 시군별 유효적산온도(10°C)($^{\circ}\text{C}$) 전망 분포도
- 104 그림 5-1 충청북도의 시군별 기후변화 전망 요약(RCP6.0, 2071~2100년)

제1장 서론

'신기후체제 대비 충청북도 기후변화 전망보고서'는 광역시도별로 시·군·구 단위의 지역범위에서 일관성 있고, 체계적인 미래 기후변화 정보를 제공하여, 전국 지방자치단체의 일관된 기후변화 적응대책을 수립하는 데 효과적인 도움이 되는 방안을 제시하기 위해 작성한 보고서임.


이미 RCP4.5/RCP8.5 시나리오 기반 전망보고서를 생산 완료했으나, 신기후체제 목표와 부합되는 RCP2.6/6.0 시나리오에 따른 전망보고서를 추가로 작성함.

1. 지리적 특성

- 우리나라[※] 중심부에 위치한 충청북도는 동쪽으로 경상북도 문경시, 상주시, 영주시, 예천군, 서쪽으로 충청남도 대전광역시, 세종특별자치시, 천안시, 남쪽으로 경상북도 김천시, 전라북도 무주군, 충청남도 금산군, 북쪽으로 강원도 영월군, 경기도 안성시, 여주시, 원주시, 이천시에 접해 있음.

※ 본 보고서에 사용되는 '우리나라'는 남한을 지칭함.

그림 1-1.
충청북도의 행정구역 구분과
관측 지점의 위치



- 충청북도는 2014년 7월 1일 청주시와 청원군이 통합된 이후 3개시 8개군의 행정체계를 갖추게 되었음(그림 1-1). 2016년 12월 현재 총인구는 1,591,625명이며, 총면적은 7,407.3km²로, 대한민국 총면적(100,387.4km²)의 7.4%에 해당함. 충청북도 내 가장 큰 면적을 차지하는 곳은 충주시(983.6km²)이며, 가장 작은 곳은 증평군(81.8km²)임*.
- 충청북도는 우리나라에서 유일하게 바다와 닿아있는 곳이 없는 지역으로, 동북쪽에 태백산맥, 동쪽에 소백산맥, 서북쪽에 차령산맥이 있는 거대한 분지형태의 지형을 형성하고 있음. 동쪽으로 태화산(1,027m), 흰봉산(1,261m), 월악산(1,095m), 대미산(1,115m) 등의 산이 위치하고 남쪽으로 민주지산(1,242m), 각호산(1,202m), 황악산(1,111m) 등의 산이 위치하며 북쪽으로 백운산(1,087m), 구학산(983m), 감악산(954m) 등의 산이 위치함. 주요 하천으로는 동북쪽에 위치한 남한강과 서남쪽에 위치한 금강이 있음. 이 밖에도 남한강 유역에 주포천, 달천, 요도천이 있고, 금강 유역으로 미호천, 보강천, 병천천, 조천천, 무심천 용수천 등의 하천이 있음.

* 참고문헌
행정자치부(2017),
지방자치단체 행정구역 및 인구
현황(2016.12.31.현재).

2. 관측 자료 소개

- 우리나라의 고해상도 격자형 관측 자료를 산출하기 위해 75개의 종관 관측 지점(Automated Synoptic Observing System, ASOS)과 462개의 자동기상 관측 지점(Automatic Weather System, AWS)을 합한 총 537개의 관측 지점의 자료를 사용하였음. 충청북도에는 5개의 종관 관측 지점과 24개의 자동기상 관측 지점이 위치함(그림 1-1).
- 분석기간은 2001년부터 2010년까지 10년이며, 변수로는 일별기온(최고/평균/최저)과 일강수량이 사용되었음. 관측 자료는 해발고도가 높은 일부 산악지역을 제외한 대부분의 지역을 고루 포함함. 관측 지점수와 관측 자료의 품질을 고려하여 2000년 이후의 관측 자료를 사용하여 상세 공간해상도를 확보함.
- 관측 자료를 거리, 고도, 지향면, 해양도를 고려하여 내삽하고 1km 해상도의 격자자료로 산출한 후 각 시·군·구에 해당하는 격자를 평균하여 행정구역별 자료를 생산하였음. 고해상도 격자형 관측 자료 산출방법은 MK-PRISM** (Modified-Korean Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model)을 적용하였음.
- 본 보고서의 현재 기후값은 위에 제시한 고해상도 격자형 관측 자료를 이용한 2001~2010년의 10년 평균값임.

**) 참고문헌
김맹기 등(2012),
1km 해상도의 관측 격자자료
생산 기술, 기후연구 제7권
제1호, 55~68pp.

3. 고해상도 시나리오 자료 소개

- 본 보고서의 기후변화 시나리오는 기후변화에 관한 정부 간 협의체(IPCC)에서 5차 평가보고서용으로 생산한 온실가스 배출 시나리오인 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오를 사용하였음. 온실가스 배출 시나리오는 표 1-1과 같이 총 4종으로 본 보고서에서는 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0)와 인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복 가능한 경우(RCP2.6)를 기준으로 분석함.

표 1-1
RCP 시나리오별 설명 및
2100년 기준 CO₂ 농도


종류	시나리오 설명	2100년 기준 CO ₂ 농도(ppm)
RCP2.6	인간 활동에 의한 영향을 지구 스스로가 회복 가능한 경우	420
RCP4.5	온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우	540
RCP6.0	온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우	670
RCP8.5	현재 추세(저감없이)로 온실가스가 배출되는 경우	940

- 시나리오 산출과정은 우선 약 135km 해상도의 전지구 기후변화 시나리오를 산출하고, 이어 지역기후모델을 이용하여 한반도에 대한 12.5km 해상도의 지역 기후변화 시나리오를 산출함. 전지구 기후변화 시나리오는 영국기상청의 HadGEM2-AO 모델을, 한반도 기후변화 시나리오는 영국기상청 지역기후모델인 HadGEM3-RA를 사용하여 산출함.
- 고해상도(1km) 우리나라 상세 기후변화 시나리오는 다음과 같은 과정을 거쳐 생산함. 1) 앞서 생산한 1km 해상도의 관측 격자자료를 2001~2010년 기간에 대해 평균하여 관측 기후값을 만듦. 2) 12.5km 한반도 지역 기후변화 시나리오 자료를 1km로 객관분석한 후 각 격자점별로 계절 변동(Seasonal Cycle)을 제거한 편차(Anomaly)를 추출함. 3) 1)의 관측 기후값과 2)의 미래 기후변화 전망 편차를 더하여 1km 해상도의 상세 기후변화 시나리오를 생산함(그림 1-2). 이상의 통계적 상세화 방법(MK-PRISM) 기반의 PRIDE^{*)} 모델을 사용하여 생산함.

*) PRIDE

PRISM based Downscaling
Estimation

- 기후변화 시나리오를 이용한 미래 전망 예측 시, 현재에 대한 분석은 기존 보고서와의 통일성을 위해 2001~2010년의 10년 평균값을 사용하였고, 기후변화 시나리오를 이용한 미래 전망은 10년단위 평균값 뿐 아니라 21세기 전반기(2021~2040년), 21세기 중반기(2041~2070년), 21세기 후반기(2071~2100년)로 나누어 분석을 수행함.



- 본 보고서에서는 400년 제어적분으로 산출한 기후변화 시나리오를 사용했기 때문에 200년 제어적분으로 산출한 기존 보고서(한반도 기후변화 전망보고서, 2012년, 기상청)와는 전망값이 다를 수 있음. 또한 최근 10년 기후특성의 시·군·구별 값은 2014년 12월 기준 행정구역 정보를 적용하였기 때문에 행정구역 변화로 인해 기존 보고서 값과 차이가 있을 수 있음.

4. 극한기후지수 정의

- 본 보고서에서는 기온과 강수량 이외에 8개 기온 관련 극한기후지수(열대야일수, 폭염일수, 서리일수, 결빙일수, 여름일수, 식물성장가능기간, 한파일수, 일교차)와 4개 강수 관련 기후지수(강수강도, 호우일수, 최대무강수지속기간, 5일최다강수량)를 분석하였으며, 각 지수의 정의는 표 1-2와 같음. 1km 해상도의 격자자료로 극한기후지수를 산출한 후 각 시·군·구에 해당하는 격자를 평균하여 행정구역별 극한기후지수를 생산하였음.
- 강수강도와 호우일수의 경우는 지역기후모델 자료의 극값이 관측 자료보다 절대값이 크게 산출되므로 다음과 같이 각 격자별로 보정하여 분석하였음.
 - 보정된 극한기후지수 = 보정상수 × 극한기후지수

$$\text{보정상수} = \frac{\text{관측 격자자료의 극한기후지수 기후값}(2000\sim2010\text{년})}{(\text{관측 격자자료 기후값} + 12.5\text{km 지역기후모델 편차}) \times \text{극한기후지수 기후값}(2000\sim2010\text{년})}$$

표 1-2
기온 및 강수 관련
극한기후지수의 정의

요소	극한기후지수	정의	단위
기온	열대야일수 (Tropical Nights)	일최저기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수	일
	폭염일수 (Heat Wave Days)	일최고기온이 33°C 이상인 날의 연중 일수	일
	서리일수 (Frost Days)	일최저기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수	일
	결빙일수 (Ice Days)	일최고기온이 0°C 미만인 날의 연중 일수	일
	여름일수 (Summer Days)	일최고기온이 25°C 이상인 날의 연중 일수	일
	식물성장가능기간 (Growing Season Length)	일평균기온이 5°C 보다 높은 날이 6일 이상 지속된 첫 날부터 일평균기온이 5°C 미만인 날이 6일 이상 지속된 첫 날까지 사이의 연중 일수	일
	한파일수 (Cold Wave Days)	일최저기온이 -12°C 이하인 날의 연중 일수	일
강수	일교차 (Diurnal Temperature Range)	일최고기온과 일최저기온 차이 값의 연평균	°C
	강수강도 (Simple Daily Intensity Index)	연중 습윤일수(일강수량이 1.0mm 이상인 날)로 나누어진 연 총강수량	mm/일
	호우일수 (Heavy Rain Days)	일강수량이 80mm 이상인 날의 연중일수	일
	최대무강수지속기간 (Maximum Length of Dry Spell)	연중 일강수량 1mm 미만인 날의 최대 지속 일수	일
	5일최다강수량 (Maximum Consecutive 5-day Precipitation)	연중 5일 연속으로 내린 강수량 중 최다값	mm

5. 응용정보 정의

- 본 보고서에서는 농업분야 2개, 보건분야 2개, 에너지분야 2개의 총 6개 응용정보를 사용하였고, 각 지수의 정의는 표 1-3과 같음.

요소	응용정보	정의	산출방법	단위
농업	유효적산온도	작물의 생육에 필요한 열량을 나타내기 위한 것으로 일평균기온에서 생육한계온도(5, 10°C)를 뺀 값을 적산한 값	EAT = $\sum(T_a - T_b)$ ※ Ta : 일평균기온, Tb(생육한계온도) = 5°C, 10°C	°C
	생육도일	일최고기온과 일최저기온의 평균에서 작물별 기본온도를 뺀 것을 생육기간동안 합한 값	GDD = $\sum\{(T_{max} + T_{min})/2 - T_b\}$ ※ Tb(기본온도) = 5°C, 10°C	도일
보건	열지수	일사병이나 열 경련의 위험도를 나타내는 지수	HI = $-42.379 + 2.04901523 \times T_f + 10.14333127 \times RH - 0.22475541 \times T_f \times RH - 6.83783 \times 10^{-3} \times T_f^2 - 5.481717 \times 10^{-2} \times RH^2 + 1.22874 \times 10^{-3} \times T_f^2 \times RH + 8.5282 \times 10^{-4} \times T_f \times RH^2 - 1.99 \times 10^{-6} \times T_f^2 \times RH^2$ ※ Tf: 최고기온, RH: 상대습도	
	불쾌지수	체감기후를 나타내는 온습도지수	DI = $9/5 \times T_a - 0.55 \times (1 - RH)(9/5 \times T_a - 26) + 32$ ※ Ta: 최고기온, RH: 상대습도	
에너지	냉방도일	냉방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 일평균기온에서 기준온도(24°C)를 뺀 값을 적산한 값	CDD = $\sum(\text{일평균기온} - 24)$	도일
	난방도일	난방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 기준온도(18°C)에서 일평균기온을 뺀 값을 적산한 값	HDD = $\sum(18 - \text{일평균기온})$	도일

표 1-3
농업, 보건, 에너지분야
응용정보의 정의

6. 계절길이 정의

- 본 보고서에서 사용한 계절 시작일과 계절길이의 정의는 표 1-4와 같음.

계절	계절 시작일 정의	계절길이 정의
봄	일평균기온이 5°C 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날	봄 시작일부터 여름 시작일 전날까지
여름	일평균기온이 20°C 이상 올라간 후 다시 떨어지지 않는 첫날	여름 시작일부터 가을 시작일 전날까지
가을	일평균기온이 20°C 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫날	가을 시작일부터 겨울 시작일 전날까지
겨울	일평균기온이 5°C 미만으로 떨어진 후 다시 올라가지 않는 첫날	겨울 시작일부터 봄 시작일 전날까지

표 1-4
계절 시작일과 계절길이 정의

※) 계절길이 산출 시 일평균기온을 9일 이동평균한 자료를 사용하였음.

제2장

최근 10년 기후특성

1. 기온

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 기후값^{※)}

- 우리나라 중심부에 위치한 충청북도의 연평균기온은 10.9°C 로 우리나라 연평균기온(12.8°C) 보다 1.9°C 더 낮음(표 2-1).
- 충청북도에서 연평균기온이 가장 높은 지역은 청주시(11.7°C)이고, 가장 낮은 지역은 단양군(9.9°C)이며, 그 차이는 1.8°C 임.
- 충청북도의 연평균 일최고기온은 17.2°C , 연평균 일최저기온은 5.4°C 로 나타났고, 그 차이는 11.8°C 임.

※ 제2장의 우리나라의 최근 10년 기후값은 45개 지점 관측값을 토대로 산출되었음.

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 극한값

- 충청북도의 열대야일수와 폭염일수는 각각 0.3일, 8.9일로 우리나라 평균(3.7일, 10.2일)과 비교하여 열대야일수와 폭염일수가 각각 3.4일, 1.3일 더 적음.
- 열대야일수는 청주시(0.9일)에서 가장 많고 제천시, 괴산군, 단양군, 영동군(0.1일)에서 가장 적음.
- 폭염일수는 옥천군에서 12.5일로 가장 많고 단양군에서 5.3일로 가장 적음.

그림 2-1
충청북도의 시군별 연평균기온($^{\circ}\text{C}$)
분포도(2001~2010년)

14




표 2-1
충청북도의 일평균·최고·최저기온
및 극한기후지수(2001~2010년)

	기온(℃)			열대야일수 (일)	폭염일수 (일)
	일평균	일최고	일최저		
충청북도	10.9	17.2	5.4	0.3	8.9
제천시	10.1	16.3	4.7	0.1	6.4
청주시	11.7	17.9	6.4	0.9	10.4
충주시	11.0	17.4	5.4	0.5	11.5
괴산군	10.4	17.1	4.7	0.1	7.4
단양군	9.9	16.1	4.3	0.1	5.3
보은군	10.8	17.2	5.3	0.2	7.9
영동군	11.0	17.3	5.6	0.1	8.3
옥천군	11.6	18.0	6.2	0.5	12.5
음성군	11.2	17.7	5.6	0.3	10.5
증평군	11.3	17.8	5.8	0.7	11.2
진천군	11.2	17.8	5.8	0.3	9.3

2. 강수량

● 최근 10년(2001~2010년) 강수량 기후값

- 충청북도의 연강수량은 1,351.3mm로 우리나라 평균인 1,358.5mm보다 7.2mm 더 적음 (표 2-2).
- 충청북도 내에서는 단양군이 연강수량 1,480.4mm로 가장 많고, 증평군은 1,263.7mm로 가장 적어서 그 차이가 216.7mm로 나타남.

● 최근 10년(2001~2010년) 강수 극한값

- 충청북도의 강수강도는 15.3mm/일로 우리나라 평균(16.5mm/일)보다 1.2mm/일 더 약하고 호우일수도 1.8일로 우리나라 평균(2.5일)보다 0.7일 더 적음.
- 강수강도는 단양군에서 16.8mm/일로 가장 강하고, 영동군, 증평군에서 14.6mm/일로 가장 약해서 그 차이가 2.2mm/일로 나타남.
- 호우일수는 단양군에서 2.2일로 가장 많고 보은군, 옥천군에서는 1.4일로 가장 적음.

그림 2-2
충청북도의 시군별 연강수량(mm)
분포도(2001~2010년)

16




표 2-2
충청북도의 계절 및 연강수량과
극한기후지수(2001~2010년)

	강수량(mm)					강수강도 (mm/일)	호우일수 (일)
	봄	여름	가을	겨울	연		
충청북도	230.0	809.5	229.1	78.0	1351.3	15.3	1.8
제천시	231.0	838.4	245.3	73.3	1391.3	15.7	2.1
청주시	219.1	765.3	219.6	77.2	1286.1	14.8	1.6
충주시	217.4	790.0	235.7	69.7	1315.9	15.2	1.9
괴산군	234.3	818.8	230.5	80.7	1368.0	15.1	1.7
단양군	259.4	893.1	249.3	75.2	1480.4	16.8	2.2
보은군	240.7	801.0	217.1	88.4	1351.8	14.9	1.4
영동군	228.5	792.5	210.0	89.2	1327.4	14.6	1.7
옥천군	221.8	792.2	205.9	84.9	1311.9	14.8	1.4
음성군	222.8	800.1	238.8	70.6	1337.3	15.6	1.9
증평군	210.0	765.0	209.5	73.7	1263.7	14.6	1.7
진천군	230.2	809.1	238.5	73.1	1356.5	15.7	1.8



3. 기타 요소

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 관련 현상일수

- 충청북도는 연평균 일최저기온이 우리나라 평균(8.1°C)보다 2.7°C 더 낮아서 서리일수가 133.9일로 우리나라 평균(97.2일)보다 36.7일 더 많음. 충청북도의 연평균 일최고기온은 우리나라 평균(18.3°C)보다 1.1°C 더 낮아서 결빙일수는 20.4일로 우리나라 평균(8.4일)보다 12.0일 더 많음. 여름일수는 110.4일로 우리나라 평균(114.0일)보다 3.6일 더 적으며, 식물성장가능기간은 248.0일로 우리나라 평균(277.2일)보다 29.2일 더 짧게 나타남 (표 2-3).
- 서리일수는 청주시에서 123.2일, 결빙일수는 옥천군에서 14.4일로 가장 적어서 식물성장가능기간은 옥천군에서 255.4일로 가장 길게 나타남.
- 여름일수는 증평군에서 121.4일로 가장 많고, 단양군에서 92.3일로 가장 적으며 그 차이가 29.1일로 나타남.

표 2-3
충청북도의 기온 관련
극한기후지수(2001~2010년)

	서리일수 (일)	결빙일수 (일)	여름일수 (일)	식물성장가능기간 (일)
충청북도	133.9	20.4	110.4	248.0
제천시	139.0	27.6	99.0	240.4
청주시	123.2	16.4	120.8	255.1
충주시	134.7	21.4	117.1	248.7
괴산군	141.6	21.5	107.5	243.1
단양군	142.3	25.4	92.3	238.5
보은군	135.5	20.9	108.0	247.0
영동군	131.5	18.1	106.5	250.4
옥천군	125.9	14.4	118.9	255.4
음성군	132.4	18.0	120.6	252.4
증평군	131.2	17.7	121.4	253.0
진천군	129.5	16.2	120.7	253.9

제3장

기후변화 전망

1. 기온 및 강수량

1) 평균기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 충청북도 연평균기온은 현재 대비 2040년대에는 0.6°C , 2090년대에는 2.8°C 더 상승할 것으로 전망됨(표 3-2).
- 현재 충청북도 연평균기온(10.9°C)은 우리나라 평균(12.8°C)보다 1.9°C 더 낮으며, RCP6.0에서 충청북도의 미래(2071~2100년) 연평균기온 상승 정도($+2.2^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 전체 상승폭보다 0.2°C 더 낮을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균기온 변화 : (2001~2010년) $12.8^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) $15.2^{\circ}\text{C}(2.4^{\circ}\text{C}$ 상승)

- 충청북도 내 지역별 연평균기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재대비 2090년대 충청북도의 연평균기온 상승폭은 1.4°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-1, 표 3-2).

※ 현재 대비 2090년대 충청북도 연평균기온 변화 : (RCP6.0) 2.8°C 상승 \rightarrow (RCP2.6) 1.4°C 상승

● 아열대 기후구 전망

- 충청북도는 RCP6.0과 RCP2.6 시나리오 모두에서 2100년까지 아열대 기후에 속하지 않을 것으로 전망됨.

※ 트레와다 아열대 기후구 정의 : 월평균기온 10°C 이상인 달이 8개월 이상, 가장 추운 달 평균기온이 18°C 이하인 경우




그림 3-1
충청북도에서 연평균기온($^{\circ}\text{C}$)
상승율이 가장 큰 지역(단양군)과
작은 지역(청주시)의 시계열

표 3-1
충청북도 연평균기온 전망의
현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)


	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	10.9	+0.8	+1.3	+1.2	+1.6	+1.2	+1.1	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
제천시	10.1	+0.9	+1.3	+1.2	+1.7	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.1	+1.4	+1.3
청주시	11.7	+0.8	+1.3	+1.2	+1.6	+1.2	+1.1	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
충주시	11.0	+0.8	+1.2	+1.2	+1.6	+1.2	+1.1	+1.3	+1.3	+1.0	+1.3	+1.3
괴산군	10.4	+0.9	+1.3	+1.3	+1.7	+1.3	+1.2	+1.4	+1.5	+1.1	+1.4	+1.4
단양군	9.9	+0.9	+1.4	+1.3	+1.7	+1.3	+1.3	+1.5	+1.5	+1.2	+1.5	+1.4
보은군	10.8	+0.8	+1.3	+1.2	+1.6	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
영동군	11.0	+0.8	+1.3	+1.3	+1.6	+1.3	+1.2	+1.4	+1.5	+1.1	+1.4	+1.4
옥천군	11.6	+0.8	+1.3	+1.2	+1.6	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.0	+1.4	+1.3
음성군	11.2	+0.8	+1.3	+1.2	+1.6	+1.2	+1.1	+1.3	+1.3	+1.0	+1.3	+1.3
증평군	11.3	+0.8	+1.3	+1.3	+1.6	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.1	+1.4	+1.3
진천군	11.2	+0.9	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.1	+1.4	+1.3

표 3-2
충청북도 연평균기온 전망의
현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	10.9	-0.1	+0.5	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
제천시	10.1	+0.0	+0.6	+0.6	+0.8	+1.5	+1.5	+2.3	+2.9	+0.3	+0.9	+2.2
청주시	11.7	+0.0	+0.5	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.3	+0.9	+2.2
충주시	11.0	+0.0	+0.5	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.3	+0.9	+2.2
괴산군	10.4	+0.0	+0.6	+0.7	+0.8	+1.5	+1.6	+2.4	+2.9	+0.3	+1.0	+2.3
단양군	9.9	+0.0	+0.7	+0.7	+0.9	+1.6	+1.6	+2.4	+3.0	+0.3	+1.0	+2.3
보은군	10.8	-0.1	+0.5	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.2	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
영동군	11.0	-0.1	+0.6	+0.7	+0.8	+1.5	+1.5	+2.3	+2.9	+0.3	+1.0	+2.2
옥천군	11.6	-0.1	+0.5	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.2	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
음성군	11.2	+0.0	+0.6	+0.6	+0.8	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.3	+0.9	+2.2
증평군	11.3	+0.0	+0.6	+0.7	+0.8	+1.5	+1.6	+2.3	+2.9	+0.3	+1.0	+2.3
진천군	11.2	+0.1	+0.6	+0.7	+0.8	+1.5	+1.6	+2.4	+2.9	+0.4	+1.0	+2.3

표 3-3
충청북도의 계절별 평균기온
전망(℃)

지역	시나 리오	봄			여름			가을			겨울		
		전반기	중반기	후반기									
충청북도	RCP2.6	11.2	11.7	11.4	23.7	24.3	24.1	13.2	13.5	13.6	-0.3	-0.5	-0.3
	RCP6.0	10.7	11.2	12.4	23.1	24.0	25.1	12.6	13.3	14.7	-1.8	-1.2	0.1



2) 일최고기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 충청북도 연평균 일최고기온은 현재(2001~2010년) 대비 2040년대에는 0.7°C , 2090년대에는 3.0°C 더 상승할 것으로 전망됨(표 3-5).
- 현재 충청북도 연평균 일최고기온(17.2°C)은 우리나라 평균(18.3°C)보다 1.1°C 더 낮으며, RCP6.0에서 충청북도의 미래(2071~2100년) 연평균 일최고기온 상승 정도($+2.3^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 전체 상승폭보다 0.2°C 더 적을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균 일최고기온 변화 : (2001~2010년) $18.3^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 20.8°C (2.5°C 상승)

- 충청북도 내 지역별 연평균 일최고기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 2090년대 충청북도의 연평균 일최고기온 상승폭은 1.6°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-4, 표 3-5).

※ 현재 대비 2090년대 충청북도 연평균 일최고기온 변화 : (RCP6.0) 3.0°C 상승 → (RCP2.6) 1.4°C 상승

표 3-4
충청북도 연평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	17.2	+0.8	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.3	+1.4	+1.4	+1.0	+1.4	+1.4
제천시	16.3	+0.8	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.2	+1.4	+1.4	+1.1	+1.4	+1.3
청주시	17.9	+0.7	+1.2	+1.3	+1.6	+1.1	+1.2	+1.4	+1.3	+1.0	+1.3	+1.3
충주시	17.4	+0.8	+1.2	+1.3	+1.7	+1.2	+1.2	+1.4	+1.3	+1.0	+1.4	+1.3
괴산군	17.1	+0.8	+1.2	+1.2	+1.6	+1.1	+1.2	+1.4	+1.3	+1.0	+1.3	+1.3
단양군	16.1	+0.9	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.3	+1.5	+1.4	+1.1	+1.4	+1.4
보은군	17.2	+0.7	+1.2	+1.2	+1.6	+1.1	+1.2	+1.4	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
영동군	17.3	+0.8	+1.3	+1.3	+1.6	+1.2	+1.3	+1.4	+1.4	+1.0	+1.3	+1.4
옥천군	18.0	+0.7	+1.2	+1.2	+1.6	+1.1	+1.2	+1.4	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
음성군	17.7	+0.8	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.3	+1.5	+1.4	+1.1	+1.4	+1.4
증평군	17.8	+0.8	+1.3	+1.4	+1.7	+1.2	+1.3	+1.5	+1.4	+1.1	+1.4	+1.4
진천군	17.8	+0.8	+1.3	+1.3	+1.7	+1.2	+1.3	+1.5	+1.4	+1.1	+1.4	+1.4

표 3-5
충청북도 연평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	17.2	+0.0	+0.6	+0.7	+0.9	+1.5	+1.5	+2.3	+3.0	+0.3	+1.0	+2.3
제천시	16.3	+0.0	+0.6	+0.6	+0.9	+1.5	+1.5	+2.3	+3.0	+0.3	+1.0	+2.3
청주시	17.9	+0.0	+0.5	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+2.3	+2.9	+0.2	+0.9	+2.2
충주시	17.4	+0.0	+0.5	+0.6	+0.9	+1.4	+1.5	+2.3	+2.9	+0.3	+1.0	+2.2
괴산군	17.1	+0.0	+0.5	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+2.3	+2.9	+0.2	+0.9	+2.2
단양군	16.1	+0.0	+0.6	+0.6	+0.9	+1.5	+1.5	+2.4	+3.0	+0.3	+1.0	+2.3
보은군	17.2	-0.1	+0.5	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+2.2	+2.9	+0.2	+0.9	+2.2
영동군	17.3	-0.1	+0.5	+0.7	+0.8	+1.5	+1.4	+2.2	+2.9	+0.2	+1.0	+2.2
옥천군	18.0	-0.1	+0.5	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+2.2	+2.9	+0.2	+0.9	+2.1
음성군	17.7	+0.1	+0.6	+0.7	+0.9	+1.5	+1.5	+2.4	+3.0	+0.3	+1.1	+2.3
증평군	17.8	+0.1	+0.6	+0.7	+1.0	+1.5	+1.5	+2.4	+3.0	+0.4	+1.1	+2.3
진천군	17.8	+0.1	+0.6	+0.7	+0.9	+1.5	+1.5	+2.4	+3.0	+0.3	+1.0	+2.3




표 3-6

충청북도 여름철 평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	28.4	+0.4	+1.1	+1.3	+1.9	+1.0	+0.7	+1.4	+1.5	+0.8	+1.4	+1.2
제천시	27.7	+0.5	+1.1	+1.4	+2.0	+1.1	+0.7	+1.3	+1.5	+0.8	+1.5	+1.2
청주시	29.0	+0.4	+1.1	+1.3	+1.8	+0.9	+0.7	+1.4	+1.4	+0.7	+1.4	+1.2
충주시	28.9	+0.5	+1.1	+1.4	+1.9	+1.0	+0.7	+1.3	+1.4	+0.8	+1.4	+1.1
괴산군	28.2	+0.5	+1.1	+1.4	+1.9	+1.0	+0.7	+1.4	+1.4	+0.8	+1.4	+1.2
단양군	27.2	+0.5	+1.1	+1.4	+2.0	+1.1	+0.7	+1.4	+1.5	+0.8	+1.5	+1.2
보은군	28.2	+0.5	+1.2	+1.3	+1.8	+1.1	+0.8	+1.5	+1.5	+0.8	+1.4	+1.3
영동군	28.1	+0.4	+1.2	+1.3	+1.8	+1.0	+0.7	+1.5	+1.6	+0.8	+1.3	+1.3
옥천군	29.0	+0.3	+1.1	+1.2	+1.7	+0.9	+0.7	+1.4	+1.5	+0.7	+1.3	+1.2
음성군	29.0	+0.5	+1.1	+1.4	+1.9	+1.0	+0.7	+1.4	+1.4	+0.8	+1.4	+1.2
증평군	29.0	+0.5	+1.2	+1.4	+1.9	+1.0	+0.8	+1.5	+1.4	+0.9	+1.5	+1.2
진천군	28.9	+0.5	+1.1	+1.4	+1.9	+0.9	+0.7	+1.4	+1.4	+0.8	+1.4	+1.1

표 3-7

충청북도 여름철 평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	28.4	+0.3	+0.3	+0.8	+1.3	+1.5	+1.6	+2.2	+3.1	+0.3	+1.2	+2.3
제천시	27.7	+0.4	+0.3	+0.7	+1.5	+1.5	+1.7	+2.3	+3.1	+0.4	+1.2	+2.3
청주시	29.0	+0.5	+0.3	+0.7	+1.2	+1.4	+1.6	+2.3	+3.2	+0.4	+1.1	+2.3
충주시	28.9	+0.5	+0.4	+0.7	+1.4	+1.5	+1.7	+2.3	+3.2	+0.4	+1.2	+2.4
괴산군	28.2	+0.4	+0.3	+0.8	+1.3	+1.5	+1.6	+2.3	+3.1	+0.3	+1.2	+2.3
단양군	27.2	+0.3	+0.3	+0.7	+1.4	+1.5	+1.6	+2.2	+3.1	+0.3	+1.2	+2.3
보은군	28.2	+0.2	+0.2	+0.8	+1.2	+1.5	+1.6	+2.2	+3.1	+0.2	+1.2	+2.3
영동군	28.1	+0.0	+0.2	+0.9	+1.1	+1.6	+1.6	+2.2	+3.1	+0.1	+1.2	+2.3
옥천군	29.0	+0.1	+0.1	+0.8	+1.1	+1.4	+1.5	+2.1	+3.1	+0.1	+1.1	+2.2
음성군	29.0	+0.7	+0.4	+0.8	+1.5	+1.6	+1.7	+2.4	+3.2	+0.5	+1.3	+2.5
증평군	29.0	+0.6	+0.4	+0.8	+1.4	+1.5	+1.8	+2.4	+3.3	+0.5	+1.3	+2.5
진천군	28.9	+0.7	+0.4	+0.8	+1.4	+1.5	+1.7	+2.4	+3.2	+0.5	+1.2	+2.4

그림 3-4
충청북도의 시군별 여름철 평균
일최고기온(℃) 전망 분포도




표 3-8

충청북도 겨울철 평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)


	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	4.1	+1.5	+1.7	+1.0	+1.9	+1.6	+1.6	+1.7	+1.8	+1.6	+1.5	+1.7
제천시	2.9	+1.7	+1.8	+1.1	+2.0	+1.7	+1.7	+1.9	+1.8	+1.7	+1.6	+1.8
청주시	4.7	+1.5	+1.8	+1.1	+2.0	+1.7	+1.7	+1.8	+1.9	+1.7	+1.6	+1.8
충주시	3.8	+1.6	+1.8	+1.1	+1.9	+1.7	+1.7	+1.9	+1.8	+1.7	+1.6	+1.8
괴산군	3.9	+1.5	+1.7	+1.0	+1.9	+1.6	+1.7	+1.8	+1.8	+1.6	+1.5	+1.7
단양군	3.2	+1.7	+1.8	+1.2	+2.0	+1.8	+1.7	+1.9	+1.9	+1.7	+1.6	+1.8
보은군	4.0	+1.5	+1.7	+1.1	+1.9	+1.6	+1.7	+1.8	+1.9	+1.6	+1.6	+1.8
영동군	4.5	+1.6	+1.7	+1.0	+1.9	+1.6	+1.6	+1.7	+1.9	+1.6	+1.5	+1.7
옥천군	5.0	+1.5	+1.7	+1.0	+1.9	+1.6	+1.6	+1.7	+1.9	+1.6	+1.5	+1.7
음성군	4.4	+1.5	+1.8	+1.0	+1.9	+1.7	+1.7	+1.8	+1.7	+1.6	+1.5	+1.7
증평군	4.5	+1.6	+1.8	+1.2	+2.0	+1.7	+1.7	+1.8	+1.8	+1.7	+1.6	+1.8
진천군	4.6	+1.6	+1.9	+1.2	+2.0	+1.7	+1.7	+1.8	+1.8	+1.7	+1.6	+1.8

표 3-9

충청북도 겨울철 평균 일최고기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	4.1	-0.3	+0.6	+0.2	+0.8	+1.3	+1.1	+2.5	+2.7	+0.1	+0.7	+2.1
제천시	2.9	-0.2	+0.6	+0.2	+0.8	+1.3	+1.2	+2.6	+2.8	+0.2	+0.8	+2.2
청주시	4.7	-0.2	+0.6	+0.3	+0.9	+1.4	+1.2	+2.6	+2.7	+0.2	+0.8	+2.2
충주시	3.8	-0.2	+0.6	+0.2	+0.8	+1.3	+1.1	+2.6	+2.7	+0.2	+0.8	+2.1
괴산군	3.9	-0.2	+0.6	+0.2	+0.8	+1.3	+1.2	+2.6	+2.7	+0.2	+0.8	+2.1
단양군	3.2	-0.2	+0.7	+0.2	+0.8	+1.4	+1.2	+2.7	+2.9	+0.2	+0.8	+2.2
보은군	4.0	-0.2	+0.6	+0.3	+0.9	+1.4	+1.3	+2.6	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
영동군	4.5	-0.2	+0.7	+0.2	+1.0	+1.4	+1.3	+2.6	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
옥천군	5.0	-0.3	+0.6	+0.3	+0.9	+1.4	+1.3	+2.6	+2.7	+0.2	+0.9	+2.2
음성군	4.4	-0.3	+0.5	+0.2	+0.7	+1.3	+1.1	+2.5	+2.7	+0.1	+0.7	+2.1
증평군	4.5	-0.2	+0.7	+0.3	+0.9	+1.4	+1.3	+2.6	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
진천군	4.6	-0.2	+0.6	+0.3	+0.8	+1.4	+1.2	+2.6	+2.8	+0.2	+0.8	+2.2

그림 3-5
충청북도의 시군별 겨울철 평균
일최고기온(°C) 전망 분포도



3) 일최저기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오에서 충청북도 연평균 일최저기온은 현재(2001~2010년) 대비 2040년대에는 0.5°C , 2090년대에는 2.7°C 더 상승할 것으로 전망됨(표 3-11).
- 현재 충청북도 연평균 일최저기온(5.4°C)은 우리나라 평균(8.1°C)보다 2.7°C 더 낮으며, RCP6.0에서 충청북도의 미래(2071~2100년) 연평균 일최저기온 상승 정도($+2.2^{\circ}\text{C}$)는 우리나라 전체 상승폭보다 0.2°C 더 적을 것으로 전망됨.

※ 우리나라 연평균 일최저기온 변화 : (2001~2010년) $8.1^{\circ}\text{C} \rightarrow$ (2071~2100년) 10.5°C (2.4°C 상승)

- 충청북도 내 지역별 연평균 일최저기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 2090년대 충청북도의 연평균 일최저기온 상승폭은 1.3°C 줄어들 것으로 전망됨(표 3-10, 표 3-11).

※ 현재 대비 2090년대 충청북도 연평균 일최저기온 변화 : (RCP6.0) 2.7°C 상승 → (RCP2.6) 1.4°C 상승

표 3-10
충청북도 연평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	5.4	+0.8	+1.3	+1.1	+1.5	+1.2	+1.1	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.2
제천시	4.7	+0.9	+1.3	+1.1	+1.6	+1.3	+1.2	+1.4	+1.5	+1.1	+1.3	+1.3
청주시	6.4	+0.8	+1.3	+1.2	+1.5	+1.2	+1.1	+1.3	+1.5	+1.0	+1.3	+1.3
충주시	5.4	+0.8	+1.3	+1.1	+1.5	+1.2	+1.1	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
괴산군	4.7	+0.8	+1.3	+1.1	+1.5	+1.2	+1.1	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.3
단양군	4.3	+1.0	+1.4	+1.2	+1.7	+1.4	+1.2	+1.5	+1.5	+1.2	+1.4	+1.4
보은군	5.3	+0.8	+1.3	+1.2	+1.5	+1.3	+1.1	+1.3	+1.5	+1.0	+1.3	+1.3
영동군	5.6	+0.8	+1.3	+1.2	+1.5	+1.3	+1.1	+1.2	+1.4	+1.0	+1.3	+1.2
옥천군	6.2	+0.7	+1.3	+1.2	+1.5	+1.3	+1.0	+1.3	+1.4	+1.0	+1.3	+1.2
음성군	5.6	+0.7	+1.2	+1.0	+1.4	+1.1	+1.0	+1.2	+1.3	+1.0	+1.2	+1.2
증평군	5.8	+0.7	+1.2	+1.1	+1.4	+1.2	+1.0	+1.2	+1.3	+1.0	+1.2	+1.2
진천군	5.8	+0.8	+1.3	+1.1	+1.5	+1.2	+1.0	+1.2	+1.4	+1.0	+1.2	+1.2

표 3-11
충청북도 연평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	5.4	-0.2	+0.6	+0.5	+0.6	+1.4	+1.5	+2.3	+2.7	+0.2	+0.8	+2.2
제천시	4.7	-0.2	+0.6	+0.6	+0.6	+1.5	+1.6	+2.4	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
청주시	6.4	-0.1	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.6	+2.3	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
충주시	5.4	-0.1	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.6	+2.3	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
괴산군	4.7	-0.1	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
단양군	4.3	-0.1	+0.7	+0.7	+0.7	+1.6	+1.6	+2.5	+2.9	+0.3	+1.0	+2.3
보은군	5.3	-0.1	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.5	+2.3	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
영동군	5.6	-0.2	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.5	+2.2	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
옥천군	6.2	-0.1	+0.6	+0.6	+0.6	+1.4	+1.5	+2.2	+2.8	+0.2	+0.9	+2.2
음성군	5.6	-0.1	+0.6	+0.5	+0.6	+1.4	+1.5	+2.2	+2.7	+0.2	+0.8	+2.2
증평군	5.8	-0.2	+0.5	+0.5	+0.6	+1.3	+1.5	+2.2	+2.7	+0.2	+0.8	+2.1
진천군	5.8	-0.1	+0.6	+0.5	+0.6	+1.4	+1.6	+2.3	+2.7	+0.2	+0.8	+2.2

그림 3-6
충청북도의 시군별 연평균
일최저기온(℃) 전망 분포도




표 3-12

충청북도 여름철 평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	18.5	+0.3	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.2	+1.5	+0.7	+1.2	+1.1
제천시	18.0	+0.2	+1.0	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.1	+1.5	+0.6	+1.2	+1.0
청주시	19.5	+0.3	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.2	+1.5	+0.7	+1.2	+1.1
충주시	18.9	+0.2	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.1	+1.4	+0.6	+1.2	+1.0
괴산군	18.1	+0.2	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.2	+1.5	+0.7	+1.2	+1.1
단양군	17.1	+0.3	+1.1	+1.1	+1.6	+1.3	+0.6	+1.2	+1.6	+0.7	+1.3	+1.2
보은군	18.5	+0.3	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.2	+1.6	+0.7	+1.2	+1.1
영동군	18.3	+0.2	+1.1	+1.0	+1.4	+1.2	+0.5	+1.1	+1.5	+0.6	+1.2	+1.1
옥천군	19.2	+0.2	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.6	+1.2	+1.5	+0.7	+1.2	+1.1
음성군	18.9	+0.3	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.6	+1.2	+1.5	+0.7	+1.3	+1.1
증평군	19.1	+0.2	+1.1	+1.0	+1.5	+1.2	+0.5	+1.2	+1.4	+0.7	+1.2	+1.0
진천군	18.8	+0.4	+1.2	+1.1	+1.6	+1.3	+0.6	+1.3	+1.6	+0.8	+1.3	+1.2

표 3-13

충청북도 여름철 평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	18.5	-0.2	+0.4	+0.6	+0.8	+1.4	+1.6	+2.0	+2.8	+0.1	+0.9	+2.1
제천시	18.0	-0.3	+0.3	+0.5	+0.7	+1.4	+1.5	+1.9	+2.7	+0.0	+0.9	+2.0
청주시	19.5	-0.2	+0.4	+0.6	+0.7	+1.5	+1.6	+2.0	+2.8	+0.1	+0.9	+2.1
충주시	18.9	-0.2	+0.4	+0.6	+0.8	+1.4	+1.6	+1.9	+2.7	+0.1	+0.9	+2.1
괴산군	18.1	-0.3	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+1.9	+2.7	+0.0	+0.9	+2.1
단양군	17.1	-0.3	+0.4	+0.6	+0.8	+1.4	+1.6	+2.0	+2.8	+0.0	+0.9	+2.1
보은군	18.5	-0.3	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.0	+2.8	+0.0	+0.9	+2.1
영동군	18.3	-0.4	+0.3	+0.5	+0.6	+1.4	+1.5	+1.9	+2.7	+0.0	+0.8	+2.0
옥천군	19.2	-0.3	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.5	+2.0	+2.8	+0.0	+0.9	+2.1
음성군	18.9	-0.1	+0.5	+0.7	+0.8	+1.5	+1.6	+2.1	+2.8	+0.2	+1.0	+2.2
증평군	19.1	-0.3	+0.4	+0.5	+0.7	+1.4	+1.5	+2.0	+2.7	+0.0	+0.9	+2.1
진천군	18.8	+0.0	+0.5	+0.7	+0.9	+1.6	+1.7	+2.2	+2.9	+0.3	+1.0	+2.2

그림 3-7
충청북도의 시군별 여름철 평균
일최저기온(°C) 전망 분포도




표 3-14

충청북도 겨울철 평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP2.6)


	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	-7.4	+1.8	+1.9	+1.0	+1.8	+1.7	+1.7	+1.6	+1.8	+1.8	+1.5	+1.7
제천시	-8.3	+1.9	+1.9	+0.9	+1.8	+1.7	+1.8	+1.7	+1.7	+1.9	+1.5	+1.7
청주시	-6.3	+1.6	+1.8	+1.0	+1.7	+1.6	+1.6	+1.5	+1.7	+1.7	+1.4	+1.6
충주시	-7.7	+1.7	+1.9	+0.8	+1.6	+1.6	+1.7	+1.6	+1.6	+1.8	+1.4	+1.6
괴산군	-8.2	+1.7	+1.9	+0.9	+1.7	+1.7	+1.7	+1.7	+1.8	+1.8	+1.4	+1.7
단양군	-8.1	+2.1	+2.1	+1.1	+2.0	+1.9	+1.9	+1.9	+1.9	+2.1	+1.7	+1.9
보은군	-7.3	+1.6	+1.8	+1.1	+1.8	+1.6	+1.5	+1.6	+1.8	+1.7	+1.5	+1.6
영동군	-6.5	+1.5	+1.7	+1.0	+1.8	+1.6	+1.5	+1.5	+1.8	+1.6	+1.4	+1.6
옥천군	-6.3	+1.6	+1.8	+1.1	+1.8	+1.6	+1.5	+1.6	+1.7	+1.7	+1.5	+1.6
음성군	-7.5	+1.7	+1.8	+0.7	+1.5	+1.5	+1.6	+1.4	+1.6	+1.7	+1.3	+1.5
증평군	-7.1	+1.6	+1.8	+0.8	+1.6	+1.6	+1.6	+1.5	+1.6	+1.7	+1.3	+1.6
진천군	-7.1	+1.7	+1.9	+0.9	+1.7	+1.6	+1.7	+1.5	+1.7	+1.8	+1.4	+1.6

표 3-15

충청북도 겨울철 평균 일최저기온
전망의 현재 기후값 대비 편차(℃)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	-7.4	+0.0	+0.6	+0.3	+0.8	+1.3	+1.3	+2.6	+2.5	+0.3	+0.8	+2.1
제천시	-8.3	-0.2	+0.5	+0.0	+0.7	+1.3	+1.2	+2.7	+2.5	+0.1	+0.7	+2.1
청주시	-6.3	+0.0	+0.5	+0.3	+0.8	+1.2	+1.4	+2.4	+2.4	+0.2	+0.8	+2.0
충주시	-7.7	-0.2	+0.5	+0.1	+0.7	+1.3	+1.2	+2.5	+2.4	+0.1	+0.7	+2.0
괴산군	-8.2	+0.0	+0.6	+0.2	+0.9	+1.4	+1.3	+2.6	+2.5	+0.3	+0.8	+2.2
단양군	-8.1	-0.1	+0.7	+0.2	+0.9	+1.5	+1.4	+3.0	+2.8	+0.3	+0.9	+2.4
보은군	-7.3	-0.1	+0.5	+0.3	+0.8	+1.3	+1.3	+2.5	+2.5	+0.2	+0.8	+2.1
영동군	-6.5	-0.1	+0.6	+0.3	+0.8	+1.3	+1.4	+2.5	+2.6	+0.2	+0.8	+2.1
옥천군	-6.3	+0.0	+0.5	+0.4	+0.9	+1.3	+1.4	+2.4	+2.5	+0.3	+0.9	+2.1
음성군	-7.5	-0.1	+0.5	+0.1	+0.8	+1.2	+1.3	+2.5	+2.3	+0.2	+0.7	+2.0
증평군	-7.1	-0.1	+0.5	+0.2	+0.8	+1.3	+1.3	+2.5	+2.3	+0.2	+0.7	+2.0
진천군	-7.1	+0.0	+0.6	+0.2	+0.9	+1.3	+1.4	+2.6	+2.4	+0.3	+0.8	+2.1

그림 3-8
충청북도의 시군별 겨울철 평균
일최저기온(°C) 전망 분포도



4) 연강수량

● 2100년까지 강수량 변화경향

- RCP6.0에서 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 연강수량 증가율은 우리나라 평균에 비해 낮은 4.4%에 달할 것으로 전망됨(표 3-17).
- 지역별로 살펴보면 영동군의 연강수량 증가율이 가장 크고(8.1%), 진천군의 연강수량 증가율이 가장 작은 것으로 나타남(1.6%).

※ 우리나라 연강수량 변화 : (2001~2010년) 1,358.5mm → (2071~2100년) 1,456.9mm(7.2% 증가)

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 강수량은 증가(+4.4%)에서 감소(-1.2%)로 전환될 것으로 전망됨 (표 3-16, 표 3-17).

※ 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도 연강수량 변화 : (RCP6.0) 4.4% 증가 → (RCP2.6) 1.2% 감소



그림 3-9
충청북도에서 연강수량(mm) 증가율이
가장 큰 지역(영동군)과
작은 지역(진천군)의 시계열

표 3-16
충청북도 연강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1351.3	1347.1	1375.0	1247.4	1316.0	1394.5	1339.7	1300.7	1363.5	1361.0	1319.3	1334.7
		-0.3%	+1.8%	-7.7%	-2.6%	+3.2%	-0.9%	-3.7%	+0.9%	+0.7%	-2.4%	-1.2%
제천시	1391.3	1380.4	1448.4	1279.2	1320.2	1435.7	1402.7	1367.0	1410.8	1414.4	1345.0	1393.5
		-0.8%	+4.1%	-8.1%	-5.1%	+3.2%	+0.8%	-1.7%	+1.4%	+1.7%	-3.3%	+0.2%
청주시	1286.1	1280.0	1305.6	1182.4	1223.5	1317.6	1230.5	1221.3	1281.3	1292.8	1241.2	1244.4
		-0.5%	+1.5%	-8.1%	-4.9%	+2.4%	-4.3%	-5.0%	-0.4%	+0.5%	-3.5%	-3.2%
충주시	1315.9	1280.0	1384.3	1206.8	1292.4	1361.0	1316.6	1296.8	1329.1	1332.1	1286.7	1314.2
		-2.7%	+5.2%	-8.3%	-1.8%	+3.4%	+0.1%	-1.5%	+1.0%	+1.2%	-2.2%	-0.1%
괴산군	1368.0	1334.0	1377.3	1242.5	1344.8	1398.6	1339.1	1314.3	1379.6	1355.6	1328.6	1344.3
		-2.5%	+0.7%	-9.2%	-1.7%	+2.2%	-2.1%	-3.9%	+0.8%	-0.9%	-2.9%	-1.7%
단양군	1480.4	1510.7	1512.7	1340.2	1437.4	1495.1	1490.5	1434.5	1489.5	1511.7	1424.2	1471.5
		+2.0%	+2.2%	-9.5%	-2.9%	+1.0%	+0.7%	-3.1%	+0.6%	+2.1%	-3.8%	-0.6%
보은군	1351.8	1415.9	1355.5	1287.4	1335.9	1422.2	1317.8	1302.0	1373.1	1385.7	1348.5	1331.0
		+4.7%	+0.3%	-4.8%	-1.2%	+5.2%	-2.5%	-3.7%	+1.6%	+2.5%	-0.2%	-1.5%
영동군	1327.4	1369.1	1303.9	1278.7	1359.4	1419.3	1362.7	1256.5	1385.4	1336.5	1352.4	1334.9
		+3.1%	-1.8%	-3.7%	+2.4%	+6.9%	+2.7%	-5.3%	+4.4%	+0.7%	+1.9%	+0.6%
옥천군	1311.9	1336.4	1298.1	1249.2	1264.4	1358.3	1294.9	1229.2	1311.6	1317.2	1290.6	1278.6
		+1.9%	-1.1%	-4.8%	-3.6%	+3.5%	-1.3%	-6.3%	+0.0%	+0.4%	-1.6%	-2.5%
음성군	1337.3	1288.1	1391.9	1198.2	1303.5	1362.1	1323.6	1294.8	1326.0	1340.0	1287.9	1314.8
		-3.7%	+4.1%	-10.4%	-2.5%	+1.9%	-1.0%	-3.2%	-0.8%	+0.2%	-3.7%	-1.7%
증평군	1263.7	1222.6	1281.5	1155.6	1204.7	1301.6	1226.8	1195.2	1272.8	1252.1	1220.6	1231.6
		-3.3%	+1.4%	-8.6%	-4.7%	+3.0%	-2.9%	-5.4%	+0.7%	-0.9%	-3.4%	-2.5%
진천군	1356.5	1275.8	1361.3	1214.8	1272.0	1379.5	1309.1	1280.6	1335.0	1318.5	1288.8	1308.2
		-5.9%	+0.4%	-10.4%	-6.2%	+1.7%	-3.5%	-5.6%	-1.6%	-2.8%	-5.0%	-3.6%

표 3-17
충청북도 연강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1351.3	1267.6	1440.4	1349.3	1262.4	1414.1	1433.1	1481.7	1317.0	1354.0	1342.0	1410.6
		-6.2%	+6.6%	-0.1%	-6.6%	+4.6%	+6.1%	+9.6%	-2.5%	+0.2%	-0.7%	+4.4%
제천시	1391.3	1316.5	1459.8	1382.1	1254.4	1469.1	1473.1	1499.9	1323.0	1388.1	1368.5	1432.0
		-5.4%	+4.9%	-0.7%	-9.8%	+5.6%	+5.9%	+7.8%	-4.9%	-0.2%	-1.6%	+2.9%
청주시	1286.1	1207.3	1387.4	1309.8	1211.6	1361.6	1350.1	1426.8	1262.5	1297.4	1294.3	1346.5
		-6.1%	+7.9%	+1.8%	-5.8%	+5.9%	+5.0%	+10.9%	-1.8%	+0.9%	+0.6%	+4.7%
충주시	1315.9	1238.6	1363.5	1311.2	1162.5	1397.1	1373.4	1421.6	1252.6	1301.1	1290.3	1349.2
		-5.9%	+3.6%	-0.4%	-11.7%	+6.2%	+4.4%	+8.0%	-4.8%	-1.1%	-1.9%	+2.5%
괴산군	1368.0	1276.2	1447.9	1366.9	1282.0	1450.9	1435.4	1499.3	1321.8	1362.0	1366.6	1418.8
		-6.7%	+5.8%	-0.1%	-6.3%	+6.1%	+4.9%	+9.6%	-3.4%	-0.4%	-0.1%	+3.7%
단양군	1480.4	1388.0	1564.1	1496.5	1382.1	1563.3	1637.4	1600.1	1436.4	1476.1	1480.6	1558.0
		-6.2%	+5.7%	+1.1%	-6.6%	+5.6%	+10.6%	+8.1%	-3.0%	-0.3%	+0.0%	+5.2%
보은군	1351.8	1281.4	1501.7	1378.0	1292.6	1407.0	1428.9	1529.3	1336.4	1391.5	1359.2	1431.5
		-5.2%	+11.1%	+1.9%	-4.4%	+4.1%	+5.7%	+13.1%	-1.1%	+2.9%	+0.5%	+5.9%
영동군	1327.4	1246.8	1483.8	1308.8	1329.1	1349.1	1441.9	1511.8	1352.0	1365.3	1329.0	1435.2
		-6.1%	+11.8%	-1.4%	+0.1%	+1.6%	+8.6%	+13.9%	+1.9%	+2.9%	+0.1%	+8.1%
옥천군	1311.9	1231.9	1472.6	1321.4	1274.6	1343.2	1386.1	1498.5	1293.4	1352.2	1313.0	1392.7
		-6.1%	+12.2%	+0.7%	-2.8%	+2.4%	+5.7%	+14.2%	-1.4%	+3.1%	+0.1%	+6.2%
음성군	1337.3	1234.7	1355.1	1303.0	1203.0	1383.7	1395.6	1399.5	1309.1	1294.9	1296.6	1368.1
		-7.7%	+1.3%	-2.6%	-10.0%	+3.5%	+4.4%	+4.7%	-2.1%	-3.2%	-3.0%	+2.3%
증평군	1263.7	1188.7	1341.9	1262.4	1190.9	1342.3	1312.5	1378.9	1228.2	1265.3	1265.2	1306.5
		-5.9%	+6.2%	-0.1%	-5.8%	+6.2%	+3.9%	+9.1%	-2.8%	+0.1%	+0.1%	+3.4%
진천군	1356.5	1251.4	1361.3	1301.1	1259.2	1389.6	1407.8	1422.9	1305.4	1306.3	1316.6	1378.7
		-7.7%	+0.4%	-4.1%	-7.2%	+2.4%	+3.8%	+4.9%	-3.8%	-3.7%	-2.9%	+1.6%

그림 3-10
충청북도의 시군별 연강수량(mm) 전망
분포도





그림 3-11
충청북도의 시군별
연강수량 변화율(%)
(2001~2010년 대비) 전망 분포도



2. 극한기후지수

1) 극한기온지수

● 2100년까지 폭염과 열대야 변화경향

- 현재 충청북도는 우리나라 평균과 비교하여 폭염일수와 열대야일수가 각각 1.3일, 3.4일 더 적고, RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 우리나라 평균 대비 폭염일수는 5.6일 더 많고 열대야일수는 11.4일 더 적을 것으로 전망됨 (표 3-19, 표 3-21).

※ 우리나라 평균 폭염일수 변화 : (2001~2010년) 10.2일 → (2071~2100년) 20.8일(10.6일 증가)
우리나라 평균 열대야일수 변화 : (2001~2010년) 3.7일 → (2071~2100년) 19.7일(16.0일 증가)
- RCP6.0의 경우, 충청북도의 폭염일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 현재의 8.9일에서 26.4일로 2.0배 증가하고, 열대야일수는 현재의 0.3일에서 8.3일로 26.7배 증가할 것으로 전망됨. 기온 상승으로 인한 폭염과 열대야 발생일수의 증가가 두드러지게 나타남.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 폭염일수가 가장 많은 지역은 증평군(33.1일), 열대야일수가 가장 많은 지역은 청주시(14.4일)로 나타남. 충청북도 내 각 시군의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 폭염일수와 열대야일수가 많은 지역이 21세기 후반기(2071~2100년)에도 많게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도 폭염일수의 증가폭은 12.6일(17.5일 → 4.9일, 72.0%), 열대야일수의 증가폭은 5.2일(8.0일 → 2.8일, 65.0%) 줄어들 전망임(표 3-18 ~ 표 3-21).

표 3-18
충청북도의 폭염일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	8.9	7.0	12.3	15.4	18.7	11.2	10.2	14.5	16.8	9.7	15.1	13.8
제천시	6.4	4.9	8.5	11.5	14.2	7.8	6.8	9.5	12.4	6.7	11.2	9.5
청주시	10.4	9.0	15.6	19.5	23.2	14.7	14.0	18.3	21.2	12.3	19.1	17.8
충주시	11.5	9.5	16.4	19.7	24.2	15.3	12.8	18.1	20.9	12.9	19.7	17.3
괴산군	7.4	5.1	9.2	12.5	15.2	8.1	7.6	11.7	13.8	7.1	11.9	11.0
단양군	5.3	4.0	6.9	9.4	11.5	6.3	5.2	7.8	9.9	5.4	9.1	7.6
보은군	7.9	5.1	9.5	12.3	14.7	8.1	8.2	12.0	13.8	7.3	11.7	11.3
영동군	8.3	6.4	12.1	14.1	17.2	10.2	9.5	14.4	15.4	9.2	13.8	13.1
옥천군	12.5	9.2	16.1	19.0	23.4	14.5	13.7	19.8	21.2	12.7	19.0	18.2
음성군	10.5	9.4	15.9	19.2	23.9	14.5	13.0	18.6	21.1	12.7	19.2	17.6
증평군	11.2	9.5	16.8	20.2	24.4	16.0	14.1	19.7	21.6	13.1	20.2	18.5
진천군	9.3	8.7	14.6	17.8	21.6	12.9	12.6	17.0	20.0	11.6	17.5	16.5

표 3-19
충청북도의 폭염일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	8.9	8.9	9.0	12.5	18.0	17.5	18.8	26.0	34.5	8.9	16.0	26.4
제천시	6.4	6.2	6.5	8.4	15.3	13.2	14.6	19.9	26.6	6.3	12.3	20.3
청주시	10.4	12.4	12.0	15.6	21.0	20.8	22.9	32.0	41.9	12.2	19.1	32.3
충주시	11.5	12.2	12.9	15.0	23.4	20.9	23.2	31.3	39.8	12.6	19.8	31.4
괴산군	7.4	7.0	6.8	10.2	15.7	14.8	16.2	23.5	31.6	6.9	13.6	23.8
단양군	5.3	4.4	4.7	6.9	12.5	11.1	12.1	16.4	22.2	4.6	10.2	16.9
보은군	7.9	6.0	5.8	10.4	14.0	14.8	15.7	22.5	32.0	5.9	13.1	23.4
영동군	8.3	6.3	7.0	12.8	14.3	17.2	17.2	22.6	31.7	6.6	14.8	23.8
옥천군	12.5	9.5	10.3	16.6	19.4	22.0	22.5	29.6	40.6	9.9	19.3	30.9
음성군	10.5	13.4	12.9	15.7	23.6	21.6	23.4	33.1	42.0	13.2	20.3	32.9
증평군	11.2	13.7	13.4	16.1	23.3	22.1	23.6	33.5	42.2	13.5	20.5	33.1
진천군	9.3	12.9	11.8	14.9	21.7	20.5	21.7	32.0	40.7	12.3	19.0	31.4

그림 3-12
충청북도의 시군별
폭염일수(일) 전망 분포도





표 3-20
충청북도의 열대야일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	0.3	1.1	2.3	3.9	6.3	2.8	1.8	3.6	4.0	1.7	4.3	3.1
제천시	0.1	0.6	1.2	2.1	3.6	1.4	0.9	1.9	2.3	0.9	2.4	1.7
청주시	0.9	2.7	5.6	7.9	12.2	6.0	4.0	8.0	7.9	4.1	8.7	6.6
충주시	0.5	1.3	2.6	4.4	6.9	3.3	1.9	3.8	4.5	1.9	4.9	3.4
괴산군	0.1	0.6	1.2	2.5	3.9	1.5	0.9	2.3	2.6	0.9	2.6	1.9
단양군	0.1	0.4	0.8	1.4	2.3	1.0	0.6	1.3	1.6	0.6	1.6	1.2
보은군	0.2	0.8	2.0	3.3	6.0	2.3	1.6	3.1	3.7	1.4	3.9	2.8
영동군	0.1	0.6	1.1	2.5	4.1	1.8	1.0	2.3	2.6	0.8	2.8	2.0
옥천군	0.5	1.5	3.8	6.0	10.1	4.3	3.0	5.6	6.1	2.6	6.8	4.9
음성군	0.3	1.1	2.5	4.7	7.0	3.3	1.9	4.0	4.3	1.8	5.0	3.4
증평군	0.7	1.9	3.4	5.7	8.7	4.0	2.6	5.5	5.2	2.6	6.1	4.4
진천군	0.3	1.2	2.6	4.5	7.1	3.2	1.9	3.9	4.2	1.9	4.9	3.3

표 3-21
충청북도의 열대야일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	0.3	0.6	1.6	1.9	2.8	6.3	5.6	7.7	11.7	1.1	3.6	8.3
제천시	0.1	0.2	0.8	1.3	1.6	4.1	3.5	4.8	8.1	0.5	2.3	5.5
청주시	0.9	1.8	4.0	3.9	6.1	10.6	10.5	13.5	19.2	2.9	6.9	14.4
충주시	0.5	0.7	2.0	2.6	3.5	7.5	6.6	9.0	13.1	1.4	4.5	9.6
괴산군	0.1	0.2	0.9	1.1	1.4	4.2	3.7	5.3	8.7	0.6	2.2	5.9
단양군	0.1	0.1	0.4	0.8	1.0	2.7	2.5	3.2	5.9	0.3	1.5	3.9
보은군	0.2	0.3	1.2	1.4	2.1	5.8	4.8	6.8	11.0	0.7	3.1	7.5
영동군	0.1	0.1	0.6	0.8	1.2	4.8	3.6	5.6	9.5	0.4	2.3	6.2
옥천군	0.5	0.8	2.3	2.6	3.9	9.5	7.9	11.3	17.0	1.5	5.3	12.1
음성군	0.3	0.8	2.2	2.3	3.5	7.3	6.6	9.2	13.3	1.5	4.4	9.7
증평군	0.7	1.1	2.8	3.0	4.4	8.7	7.9	10.3	14.4	1.9	5.4	10.9
진천군	0.3	0.9	2.1	2.2	3.5	6.9	6.5	8.9	12.2	1.5	4.2	9.2

그림 3-13
충청북도의 시군별
열대야일수(일) 전망 분포도



● 2100년까지 서리일수와 결빙일수의 변화경향

- 현재 충청북도의 서리일수는 우리나라 평균보다 36.7일 더 많고 결빙일수는 12.0일 더 많음. RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에도 충청북도의 서리일수는 우리나라 평균보다 35.5일 더 많고 결빙일수는 8.6일 더 많을 것으로 전망됨 (표 3-23, 표 3-25).

※ 우리나라 평균 서리일수 변화 : (2001~2010년) 97.2일 → (2071~2100년) 75.1일(22.1일 감소)
우리나라 평균 결빙일수 변화 : (2001~2010년) 8.4일 → (2071~2100년) 0.0일(8.4일 감소)

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도의 서리일수는 현재보다 23.3일 더 적으며, 결빙일수는 11.8일 더 적을 것으로 전망됨.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 서리일수가 가장 많은 지역은 괴산군(117.7일), 결빙일수가 가장 많은 지역은 제천시(13.5일)로 나타남. 충청북도 내 각 시군의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 서리일수와 결빙일수가 많은 지역이 21세기 후반기(2071~2100년)에도 많게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도 서리일수의 감소폭은 9.3일(23.3일 → 14.0일, 39.9%) 줄어들고, 결빙일수의 감소폭은 1.6일(11.8일 → 10.2일, 13.6%) 줄어들 전망임(표 3-22 ~ 표 3-25).

표 3-22
충청북도의 서리일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	133.9	126.6	121.9	119.0	118.0	122.3	121.5	120.2	118.0	124.2	119.7	119.9
제천시	139.0	132.1	128.2	124.9	124.4	128.0	126.6	125.5	124.1	130.2	125.7	125.4
청주시	123.2	115.9	111.2	109.1	107.3	113.1	112.0	110.4	107.4	113.5	109.8	109.9
충주시	134.7	128.3	123.6	120.6	119.6	123.5	123.2	121.7	119.6	126.0	121.2	121.5
괴산군	141.6	134.7	130.2	126.3	126.1	129.4	128.7	127.7	126.5	132.4	127.3	127.6
단양군	142.3	132.3	128.8	125.6	124.7	128.4	127.4	126.0	124.8	130.5	126.2	126.0
보은군	135.5	127.8	122.8	119.6	118.7	123.1	122.3	120.8	118.8	125.3	120.4	120.6
영동군	131.5	122.3	117.5	114.7	113.5	118.2	117.1	116.6	113.7	119.9	115.4	115.8
옥천군	125.9	119.2	113.9	111.6	110.0	115.2	114.5	113.2	110.2	116.5	112.3	112.6
음성군	132.4	127.1	121.6	119.0	118.1	122.5	122.2	121.0	117.8	124.3	119.8	120.3
증평군	131.2	125.2	119.4	117.2	115.5	120.5	120.0	118.5	115.6	122.3	117.8	118.0
진천군	129.5	123.7	118.0	115.5	114.3	119.2	118.5	117.3	113.8	120.8	116.3	116.5

표 3-23
충청북도의 서리일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	133.9	133.9	123.5	127.8	124.8	117.8	119.2	108.8	103.8	128.7	123.5	110.6
제천시	139.0	139.1	129.0	132.4	130.4	123.2	124.0	115.5	110.8	134.1	128.7	116.8
청주시	123.2	123.9	113.8	119.4	115.9	108.6	111.8	99.2	94.0	118.9	114.6	101.6
충주시	134.7	135.2	125.1	128.8	126.3	119.1	120.3	111.4	106.4	130.1	124.7	112.7
괴산군	141.6	141.0	130.4	133.8	132.2	125.1	125.5	116.1	111.3	135.7	130.4	117.7
단양군	142.3	140.8	130.7	134.1	131.3	124.1	124.5	114.7	109.8	135.8	129.8	116.3
보은군	135.5	134.9	123.7	128.6	125.9	118.8	120.2	109.0	103.6	129.3	124.4	110.9
영동군	131.5	130.5	119.6	124.8	119.5	113.2	115.1	103.5	98.1	125.0	119.2	105.6
옥천군	125.9	126.8	116.4	122.2	117.4	110.4	113.0	100.9	95.9	121.6	116.6	103.3
음성군	132.4	133.3	123.5	127.5	124.9	118.1	119.0	109.5	104.4	128.4	123.5	111.0
증평군	131.2	132.0	121.3	125.6	123.0	116.0	117.4	106.8	101.2	126.6	121.5	108.5
진천군	129.5	130.4	120.2	124.5	121.7	114.6	116.4	105.5	100.0	125.3	120.3	107.3




그림 3-14
충청북도의 시군별 서리일수(일) 전망
분포도




표 3-24
충청북도의 결빙일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	20.4	11.8	10.0	14.0	7.8	11.6	9.4	10.4	10.7	10.9	11.1	10.2
제천시	27.6	16.1	14.4	20.5	12.4	17.1	14.5	15.6	15.8	15.3	16.7	15.3
청주시	16.4	9.5	7.2	9.7	5.2	8.5	6.6	7.4	7.9	8.3	7.8	7.3
충주시	21.4	12.3	10.2	14.8	8.3	12.1	9.9	10.7	11.6	11.3	11.7	10.7
괴산군	21.5	12.6	11.0	15.0	8.3	12.6	9.8	11.2	11.3	11.8	12.0	10.8
단양군	25.4	14.5	13.4	19.0	11.0	15.3	13.2	14.0	14.0	13.9	15.1	13.7
보은군	20.9	12.2	10.4	13.6	7.9	11.8	9.5	10.6	10.3	11.3	11.1	10.1
영동군	18.1	10.4	8.7	12.4	6.5	10.0	7.9	8.9	8.9	9.6	9.6	8.6
옥천군	14.4	8.2	6.2	8.8	4.3	6.8	5.7	6.0	6.7	7.2	6.6	6.1
음성군	18.0	10.4	8.0	11.6	6.4	10.0	7.2	8.5	9.5	9.2	9.3	8.4
증평군	17.7	9.9	7.8	10.4	5.8	9.6	6.8	8.0	8.9	8.9	8.6	7.9
진천군	16.2	9.8	7.4	10.1	5.5	9.2	6.5	7.7	8.6	8.6	8.2	7.6

표 3-25
충청북도의 결빙일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	20.4	21.5	14.9	14.5	15.5	10.0	12.8	7.0	6.1	18.2	13.3	8.6
제천시	27.6	28.9	21.0	21.2	22.2	15.9	19.3	11.1	9.9	25.0	19.8	13.5
청주시	16.4	17.0	11.3	10.5	11.7	6.7	9.1	5.0	4.0	14.2	9.6	6.0
충주시	21.4	22.9	16.1	15.5	16.8	10.5	13.3	6.9	6.4	19.5	14.3	8.9
괴산군	21.5	22.4	16.0	15.2	16.2	10.6	13.5	7.2	6.4	19.2	14.0	9.0
단양군	25.4	27.2	19.0	19.6	20.1	14.0	17.5	9.5	8.3	23.1	17.9	11.8
보은군	20.9	21.6	14.9	14.4	15.2	10.3	13.0	7.6	6.5	18.3	13.3	9.0
영동군	18.1	18.5	12.3	12.5	12.8	8.3	10.5	6.3	5.3	15.4	11.2	7.4
옥천군	14.4	15.1	9.7	8.9	10.1	5.8	7.7	4.3	3.4	12.4	8.2	5.2
음성군	18.0	19.8	13.4	12.6	13.6	7.5	10.6	4.8	4.6	16.6	11.2	6.7
증평군	17.7	18.3	12.6	11.4	12.6	7.0	9.6	4.7	4.1	15.5	10.3	6.2
진천군	16.2	18.1	12.3	11.2	12.4	6.9	9.6	4.6	4.0	15.2	10.2	6.1

그림 3-15
충청북도의 시군별 결빙일수(일) 전망
분포도



● 2100년까지 식물성장가능기간과 여름일수 변화경향

- 현재 충청북도는 우리나라 평균과 비교해 식물성장가능기간은 29.2일 더 짧고 여름일수는 3.6일 더 적음. RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도의 식물성장가능기간은 우리나라 평균보다 33.9일 더 짧고 여름일수는 13.1일 더 적게 나타남(표 3-27, 표 3-29).

※ 우리나라 평균 식물성장가능기간 변화 : (2001~2010년) 277.2일 → (2071~2100) 298.3일(21.1일 증가)
우리나라 평균 여름일수 변화 : (2001~2010년) 114.0일 → (2071~2100년) 151.7일(37.7일 증가)
- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도의 식물성장가능기간은 현재 대비 6.6% 증가(248.0일 → 264.4일)하여 일년에 100.6일을 제외하고는 식물성장이 가능하며, 여름일수도 현재의 110.4일에서 138.6일로 증가할 전망임(표 3-26, 표 3-28).
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 식물성장가능기간이 가장 긴 지역은 옥천군(273.0일), 여름일수가 가장 많은 지역은 진천군(148.3일)으로 나타남.
충청북도 내 각 시군의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 지수가 높은 지역이 21세기 후반기(2071~2100년)에도 높게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도 식물성장가능기간의 증가폭은 5.7일(16.4일 → 10.7일, 34.8%), 여름일수는 12.5일(28.2일 → 15.7일, 44.3%) 줄어들 전망임(표 3-26 ~ 표 3-29).

표 3-26
충청북도의 식물성장가능기간(일)
전망 (RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	248.0	251.4	258.9	264.9	256.9	255.6	256.9	257.2	262.0	255.1	259.1	258.7
제천시	240.4	240.8	248.0	255.3	246.4	247.0	248.8	246.4	252.2	244.4	249.6	249.1
청주시	255.1	262.1	269.8	274.6	269.2	262.6	264.0	267.0	270.9	266.0	268.8	267.3
충주시	248.7	248.1	255.9	262.5	253.3	255.5	255.2	253.9	260.1	252.0	257.1	256.4
괴산군	243.1	244.6	254.3	258.9	250.5	252.4	253.2	252.0	258.4	249.4	253.9	254.5
단양군	238.5	242.5	247.0	256.0	246.6	247.3	248.9	246.6	252.9	244.8	250.0	249.5
보은군	247.0	251.7	260.1	264.8	256.9	255.4	257.2	259.1	263.3	255.9	259.0	259.8
영동군	250.4	258.5	264.8	270.7	263.2	258.3	262.5	264.1	266.8	261.6	264.1	264.5
옥천군	255.4	263.0	270.2	275.0	267.8	262.0	265.0	267.5	271.3	266.6	268.3	267.9
음성군	252.4	251.7	260.6	266.4	257.2	259.7	258.4	258.7	263.1	256.1	261.1	260.1
증평군	253.0	254.6	263.1	268.8	261.7	260.3	260.2	261.4	266.0	258.8	263.6	262.5
진천군	253.9	256.4	264.4	270.3	263.5	261.4	260.7	263.1	266.5	260.4	265.1	263.4

표 3-27
충청북도의 식물성장가능기간(일)
전망 (RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	248.0	243.3	256.7	252.0	248.8	257.3	254.1	267.9	271.1	250.0	252.7	264.4
제천시	240.4	235.7	250.6	245.0	240.5	246.8	248.7	256.8	261.4	243.1	244.1	255.6
청주시	255.1	252.1	262.5	258.8	256.6	267.6	258.7	277.8	279.3	257.3	261.0	271.9
충주시	248.7	240.9	255.8	251.5	247.8	254.1	253.1	265.9	268.2	248.4	251.1	262.4
괴산군	243.1	239.5	254.8	249.3	244.8	251.1	251.4	263.9	267.6	247.1	248.4	261.0
단양군	238.5	235.1	248.7	243.9	240.3	246.8	248.4	257.3	261.8	241.9	243.7	255.8
보은군	247.0	243.6	257.6	251.9	248.4	258.1	254.7	269.0	272.4	250.6	252.8	265.4
영동군	250.4	247.6	259.4	254.7	254.0	264.7	257.3	272.9	277.6	253.5	257.8	269.3
옥천군	255.4	251.8	262.1	258.3	256.7	269.2	260.5	278.4	280.0	257.0	261.4	273.0
음성군	252.4	243.7	258.6	254.3	250.2	258.0	254.7	269.9	272.5	251.1	254.2	265.7
증평군	253.0	247.5	261.0	255.4	252.6	261.7	255.5	271.8	274.5	254.3	256.6	267.2
진천군	253.9	247.1	261.3	255.8	253.1	263.2	256.4	273.1	276.1	254.2	257.4	268.5

그림 3-16
충청북도의 시군별
식물성장가능기간(일) 전망 분포도





표 3-28
충청북도의 여름일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	110.4	116.8	123.9	127.2	129.9	124.5	124.6	127.7	126.0	120.4	127.2	126.1
제천시	99.0	106.4	114.0	116.0	120.8	113.9	113.7	116.2	114.2	110.2	116.9	114.7
청주시	120.8	125.5	132.2	136.4	137.3	132.7	133.3	137.1	134.9	128.9	135.5	135.1
충주시	117.1	123.4	129.0	132.1	135.4	130.0	130.3	132.3	130.8	126.2	132.5	131.1
괴산군	107.5	114.7	122.3	125.1	128.5	122.6	123.2	125.7	123.8	118.5	125.4	124.2
단양군	92.3	99.4	107.8	110.1	114.8	107.9	107.1	110.1	108.5	103.6	110.9	108.5
보은군	108.0	115.0	123.2	126.4	128.7	123.4	124.2	127.2	126.0	119.1	126.2	125.8
영동군	106.5	113.3	121.2	124.7	126.1	121.9	121.8	125.4	124.6	117.2	124.2	123.9
옥천군	118.9	124.5	131.6	135.8	136.5	132.5	133.0	136.3	135.5	128.1	134.9	134.9
음성군	120.6	127.1	132.3	136.2	138.7	133.7	133.5	136.8	134.5	129.7	136.2	135.0
증평군	121.4	126.8	133.3	137.6	138.8	134.1	134.8	137.5	135.5	130.1	136.8	135.9
진천군	120.7	126.3	132.2	136.9	138.5	133.1	133.3	137.4	135.0	129.3	136.2	135.3

표 3-29
충청북도의 여름일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	110.4	112.1	111.9	116.7	118.5	130.4	131.1	137.4	147.4	112.0	121.9	138.6
제천시	99.0	102.1	100.7	104.6	108.7	119.1	120.7	127.8	138.3	101.4	110.8	128.9
청주시	120.8	122.0	121.4	126.7	127.6	139.4	140.4	145.6	155.0	121.7	131.2	147.0
충주시	117.1	119.1	118.7	123.3	124.7	136.0	136.9	143.2	152.0	118.9	128.0	144.0
괴산군	107.5	109.6	108.9	114.2	116.5	128.2	129.6	135.8	146.3	109.3	119.6	137.2
단양군	92.3	93.8	93.4	97.6	102.3	112.9	113.9	121.0	132.3	93.6	104.2	122.4
보은군	108.0	110.0	109.2	114.4	116.4	129.1	129.5	136.2	146.6	109.6	120.0	137.4
영동군	106.5	106.1	108.3	113.5	113.5	128.0	126.7	133.0	144.5	107.2	118.3	134.7
옥천군	118.9	119.9	120.7	125.7	125.4	139.0	138.6	144.0	154.0	120.3	130.0	145.5
음성군	120.6	122.9	122.8	127.9	128.7	140.2	141.3	147.2	155.8	122.8	132.3	148.1
증평군	121.4	123.1	123.9	128.2	128.8	140.3	141.3	146.8	155.8	123.5	132.5	147.9
진천군	120.7	123.1	122.9	127.6	128.3	140.1	141.4	147.1	156.4	123.0	132.0	148.3

그림 3-17
충청북도의 시군별 여름일수(일) 전망
분포도



● 2100년까지 일교차와 한파일수 변화경향

- 현재 충청북도의 일교차는 우리나라 평균보다 1.6°C 더 크고 한파일수는 12.2일 더 많음.
RCP6.0의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도의 일교차는 우리나라 평균보다 1.6°C 더 크고 한파일수는 5.7일 더 많을 것으로 전망됨(표 3-31, 표 3-33).

※ 우리나라 평균 일교차 변화 : (2001~2010년) 10.2°C → (2071~2100년) 10.3°C (0.1°C 증가)
우리나라 평균 한파일수 변화 : (2001~2010년) 5.0일 → (2071~2100년) 0.0일(5.0일 감소)

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우(RCP6.0), 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도의 일교차는 현재보다 0.1°C 더 크고, 한파일수는 11.5일 더 적을 것으로 전망됨.
- RCP6.0에서 21세기 후반기(2071~2100년)에 일교차가 가장 큰 지역은 괴산군(12.4°C), 한파일수가 가장 많은 지역은 제천시(10.3°C)로 나타남. 충청북도 내 각 시군의 기온 상승폭이 서로 비슷하기 때문에 현재 지수가 높은 지역이 21세기 후반기(2071~2100년)에도 높게 나타남.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 일교차는 현재보다 0.1°C 증가해 증가폭이 RCP6.0(0.1°C)과 동일하고, 한파일수는 9.1일 감소해 감소폭이 RCP6.0(11.5일)보다 줄어드는 것으로 나타남 (표 3-30 ~ 표 3-33).

표 3-30
충청북도의 일교차(°C) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	11.8	11.8	11.8	12.0	12.0	11.8	12.0	12.0	11.8	11.8	11.9	11.9
제천시	11.6	11.6	11.6	11.8	11.7	11.5	11.7	11.7	11.5	11.6	11.6	11.6
청주시	11.4	11.4	11.4	11.6	11.6	11.4	11.7	11.6	11.4	11.4	11.5	11.6
충주시	12.0	12.0	12.0	12.1	12.1	11.9	12.1	12.1	11.9	12.0	12.1	12.0
괴산군	12.4	12.4	12.3	12.5	12.5	12.3	12.5	12.5	12.3	12.3	12.4	12.4
단양군	11.8	11.7	11.7	11.9	11.8	11.7	11.8	11.8	11.7	11.7	11.8	11.8
보은군	11.8	11.8	11.8	12.0	11.9	11.8	12.1	12.0	11.8	11.8	11.9	11.9
영동군	11.7	11.7	11.7	11.8	11.8	11.6	11.9	11.9	11.7	11.7	11.7	11.8
옥천군	11.8	11.8	11.7	11.8	11.9	11.7	12.0	11.9	11.7	11.7	11.8	11.9
음성군	12.1	12.2	12.2	12.4	12.4	12.2	12.4	12.4	12.1	12.2	12.3	12.3
증평군	12.1	12.1	12.1	12.3	12.3	12.1	12.3	12.3	12.0	12.1	12.2	12.2
진천군	12.0	12.1	12.0	12.2	12.2	12.0	12.3	12.2	12.0	12.0	12.2	12.2

표 3-31
충청북도의 일교차(°C) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	11.8	12.0	11.8	11.9	12.1	11.9	11.8	11.8	12.0	11.9	12.0	11.9
제천시	11.6	11.7	11.5	11.6	11.9	11.6	11.5	11.5	11.7	11.6	11.7	11.6
청주시	11.4	11.6	11.4	11.5	11.7	11.5	11.3	11.5	11.7	11.5	11.6	11.5
충주시	12.0	12.1	11.9	12.0	12.2	12.0	11.9	12.0	12.2	12.0	12.1	12.0
괴산군	12.4	12.5	12.3	12.4	12.6	12.4	12.3	12.3	12.5	12.4	12.5	12.4
단양군	11.8	11.9	11.7	11.8	12.0	11.8	11.7	11.7	11.9	11.8	11.8	11.7
보은군	11.8	11.9	11.8	11.9	12.1	11.9	11.8	11.8	12.0	11.9	12.0	11.9
영동군	11.7	11.8	11.7	11.8	11.9	11.8	11.6	11.7	11.9	11.7	11.8	11.7
옥천군	11.8	11.8	11.7	11.8	12.0	11.8	11.6	11.7	11.9	11.8	11.9	11.8
음성군	12.1	12.3	12.1	12.3	12.4	12.2	12.1	12.2	12.4	12.2	12.3	12.2
증평군	12.1	12.3	12.1	12.2	12.4	12.2	12.0	12.1	12.3	12.2	12.3	12.2
진천군	12.0	12.2	12.0	12.2	12.3	12.1	11.9	12.1	12.3	12.1	12.2	12.1

그림 3-18
충청북도의 시군별 일교차(°C) 전망
분포도




표 3-32
충청북도의 한파일수(일) 전망
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	17.2	9.3	7.5	11.7	6.3	8.6	7.2	8.6	8.5	8.4	8.8	8.1
제천시	24.3	13.6	11.6	18.7	10.4	13.7	11.8	13.2	13.4	12.6	14.3	12.8
청주시	11.2	5.0	4.2	6.3	3.4	4.9	3.6	5.2	4.5	4.6	4.9	4.4
충주시	19.6	11.0	8.4	13.7	7.2	9.4	8.3	9.6	10.3	9.7	10.1	9.4
괴산군	22.9	12.9	10.5	15.7	9.2	12.1	9.8	11.8	11.4	11.7	12.3	11.0
단양군	21.3	12.1	10.4	16.8	8.5	11.8	10.3	11.6	11.5	11.2	12.4	11.1
보은군	16.9	9.2	7.0	9.4	5.6	7.8	6.9	7.8	7.1	8.1	7.6	7.3
영동군	9.8	5.6	4.4	6.2	2.5	4.5	4.0	4.9	4.0	5.0	4.4	4.3
옥천군	9.6	3.9	3.1	4.3	1.9	3.3	3.1	3.5	3.1	3.5	3.2	3.2
음성군	18.0	10.1	7.2	13.1	7.0	9.0	6.9	9.4	9.9	8.7	9.7	8.8
증평군	15.6	8.4	5.8	10.4	5.6	6.9	5.6	7.4	7.7	7.1	7.7	6.9
진천군	14.7	8.1	5.2	9.8	4.9	6.8	5.0	7.2	7.7	6.6	7.2	6.6

표 3-33
충청북도의 한파일수(일) 전망
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	17.2	17.8	11.3	12.4	12.2	6.6	8.9	4.8	3.5	14.5	10.4	5.7
제천시	24.3	26.2	17.5	19.8	19.3	11.7	16.0	7.9	7.2	21.8	16.9	10.3
청주시	11.2	10.7	6.7	6.8	7.2	3.3	3.9	2.7	1.3	8.7	5.8	2.6
충주시	19.6	20.0	12.9	14.4	13.9	7.4	10.1	5.1	4.3	16.4	11.9	6.5
괴산군	22.9	22.2	15.2	16.0	16.0	9.4	12.4	6.4	5.3	18.7	13.8	8.0
단양군	21.3	24.4	14.8	18.0	17.0	9.6	14.2	6.5	5.2	19.6	14.9	8.6
보은군	16.9	16.4	10.8	10.7	11.3	6.1	8.2	5.0	2.9	13.6	9.4	5.3
영동군	9.8	11.7	6.0	6.4	6.8	2.8	4.5	2.6	0.9	8.9	5.3	2.7
옥천군	9.6	9.3	5.0	5.0	5.5	2.2	2.7	2.0	0.7	7.2	4.2	1.8
음성군	18.0	17.8	11.6	13.1	12.0	6.5	8.2	4.7	3.7	14.7	10.5	5.5
증평군	15.6	14.7	10.0	10.5	10.1	4.8	5.8	3.5	2.2	12.4	8.5	3.8
진천군	14.7	14.4	9.3	10.1	9.5	4.5	5.7	3.3	2.2	11.9	8.0	3.7




그림 3-19
충청북도의 시군별 한파일수(일) 전망
분포도



2) 극한강수지수

● 2100년까지 강수강도와 호우일수 변화경향

- 강수강도와 호우일수의 변화는 극한기온지수에 비하여 변동성이 큼. 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0의 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 우리나라 평균 강수강도와 호우일수가 증가하는 것과 같이 충청북도의 강수강도와 호우일수 모두 증가할 것으로 전망됨(표 3-35, 표 3-37).

※ 우리나라 평균 강수강도 변화 : (2001~2010년) 16.5mm/일 → (2071~2100년) 17.9mm/일(9% 증가)

우리나라 평균 호우일수 변화 : (2001~2010년) 2.5일 → (2071~2100년) 2.9일(16% 증가)

- RCP6.0의 경우, 충청북도의 강수강도는 21세기 후반기(2071~2100년)에 15.9mm/일로 현재(15.3mm/일) 대비 3.9% 증가하고, 호우일수는 1.8일에서 2.6일로 44.4% 증가할 전망임. 강수량 증가율(4.4%)에 비해 강수강도의 증가율은 더 작게, 호우일수의 증가율은 더 크게 나타남.
- 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 강수강도 증가율이 가장 큰 지역은 RCP6.0에서는 영동군(11.6%), RCP2.6에서도 영동군(3.4%)으로 나타남. 호우일수의 경우 RCP6.0에서는 영동군(117.6%), RCP2.6에서도 영동군(64.7%)의 증가율이 가장 높게 나타남(표 3-34 ~ 표 3-37).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 강수강도는 증가율이 작아지고(+3.9% → +1.3%), 호우일수도 증가율이 작아질(+44.4% → +33.3%) 전망임(표 3-34 ~ 표 3-37).

표 3-34
충청북도의 강수강도(mm/일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	15.3	16.1	16.2	15.3	15.5	15.8	15.8	15.3	15.4	16.2	15.5	15.5
		+5.2%	+5.9%	+0.0%	+1.3%	+3.3%	+3.3%	+0.0%	+0.7%	+5.9%	+1.3%	+1.3%
제천시	15.7	16.3	17.0	15.4	15.7	16.3	16.6	15.9	15.9	16.7	15.8	16.1
		+3.8%	+8.3%	-1.9%	+0.0%	+3.8%	+5.7%	+1.3%	+1.3%	+6.4%	+0.6%	+2.5%
청주시	14.8	15.5	15.7	15.0	14.9	15.0	14.9	14.7	14.7	15.6	15.0	14.8
		+4.7%	+6.1%	+1.4%	+0.7%	+1.4%	+0.7%	-0.7%	-0.7%	+5.4%	+1.4%	+0.0%
충주시	15.2	15.7	16.5	15.0	15.7	15.9	16.0	15.3	15.3	16.1	15.5	15.5
		+3.3%	+8.6%	-1.3%	+3.3%	+4.6%	+5.3%	+0.7%	+0.7%	+5.9%	+2.0%	+2.0%
괴산군	15.1	15.4	16.0	14.9	15.3	15.1	15.3	14.7	14.8	15.7	15.1	14.9
		+2.0%	+6.0%	-1.3%	+1.3%	+0.0%	+1.3%	-2.6%	-2.0%	+4.0%	+0.0%	-1.3%
단양군	16.8	17.9	18.1	16.4	17.1	17.1	17.4	16.8	16.9	18.0	16.9	17.0
		+6.5%	+7.7%	-2.4%	+1.8%	+1.8%	+3.6%	+0.0%	+0.6%	+7.1%	+0.6%	+1.2%
보은군	14.9	16.4	15.6	15.2	15.2	15.5	14.9	15.0	14.9	16.0	15.3	15.0
		+10.1%	+4.7%	+2.0%	+2.0%	+4.0%	+0.0%	+0.7%	+0.0%	+7.4%	+2.7%	+0.7%
영동군	14.6	16.1	14.7	14.8	15.1	15.7	15.3	14.6	15.4	15.4	15.2	15.1
		+10.3%	+0.7%	+1.4%	+3.4%	+7.5%	+4.8%	+0.0%	+5.5%	+5.5%	+4.1%	+3.4%
옥천군	14.8	16.2	15.2	15.0	14.7	15.4	15.2	14.9	15.0	15.7	15.0	15.0
		+9.5%	+2.7%	+1.4%	-0.7%	+4.1%	+2.7%	+0.7%	+1.4%	+6.1%	+1.4%	+1.4%
음성군	15.6	16.2	17.0	15.6	16.0	16.0	16.3	15.5	15.5	16.6	15.9	15.8
		+3.8%	+9.0%	+0.0%	+2.6%	+2.6%	+4.5%	-0.6%	-0.6%	+6.4%	+1.9%	+1.3%
증평군	14.6	15.1	15.5	14.8	14.8	14.9	14.8	14.4	14.5	15.3	14.8	14.6
		+3.4%	+6.2%	+1.4%	+1.4%	+2.1%	+1.4%	-1.4%	-0.7%	+4.8%	+1.4%	+0.0%
진천군	15.7	16.2	16.7	15.9	15.6	16.2	16.2	15.6	15.7	16.4	15.9	15.9
		+3.2%	+6.4%	+1.3%	-0.6%	+3.2%	+3.2%	-0.6%	+0.0%	+4.5%	+1.3%	+1.3%

표 3-35
충청북도의 강수강도(mm/일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	15.3	14.6	16.6	15.3	14.3	16.2	16.1	16.7	15.0	15.6	15.3	15.9
		-4.6%	+8.5%	+0.0%	-6.5%	+5.9%	+5.2%	+9.2%	-2.0%	+2.0%	+0.0%	+3.9%
제천시	15.7	14.8	16.6	15.4	14.2	16.6	16.3	16.9	15.0	15.7	15.4	16.1
		-5.7%	+5.7%	-1.9%	-9.6%	+5.7%	+3.8%	+7.6%	-4.5%	+0.0%	-1.9%	+2.5%
청주시	14.8	14.1	16.2	15.0	13.7	15.8	15.3	16.3	14.2	15.2	14.8	15.3
		-4.7%	+9.5%	+1.4%	-7.4%	+6.8%	+3.4%	+10.1%	-4.1%	+2.7%	+0.0%	+3.4%
충주시	15.2	14.4	15.8	15.1	13.5	16.3	15.7	16.6	14.6	15.1	15.0	15.6
		-5.3%	+3.9%	-0.7%	-11.2%	+7.2%	+3.3%	+9.2%	-3.9%	-0.7%	-1.3%	+2.6%
괴산군	15.1	14.2	16.1	14.8	13.9	15.8	15.2	16.0	14.4	15.1	14.8	15.2
		-6.0%	+6.6%	-2.0%	-7.9%	+4.6%	+0.7%	+6.0%	-4.6%	+0.0%	-2.0%	+0.7%
단양군	16.8	15.7	17.9	16.8	15.6	17.7	18.2	17.7	16.2	16.8	16.7	17.4
		-6.5%	+6.5%	+0.0%	-7.1%	+5.4%	+8.3%	+5.4%	-3.6%	+0.0%	-0.6%	+3.6%
보은군	14.9	14.4	17.0	15.3	14.3	16.0	15.7	16.9	14.7	15.7	15.2	15.8
		-3.4%	+14.1%	+2.7%	-4.0%	+7.4%	+5.4%	+13.4%	-1.3%	+5.4%	+2.0%	+6.0%
영동군	14.6	14.3	17.3	14.9	15.1	15.9	16.3	17.0	15.5	15.8	15.3	16.3
		-2.1%	+18.5%	+2.1%	+3.4%	+8.9%	+11.6%	+16.4%	+6.2%	+8.2%	+4.8%	+11.6%
옥천군	14.8	14.6	17.7	15.4	14.9	16.2	16.1	17.5	15.0	16.1	15.5	16.2
		-1.4%	+19.6%	+4.1%	+0.7%	+9.5%	+8.8%	+18.2%	+1.4%	+8.8%	+4.7%	+9.5%
음성군	15.6	14.7	15.8	15.2	13.8	16.0	16.1	16.3	15.4	15.2	15.0	15.9
		-5.8%	+1.3%	-2.6%	-11.5%	+2.6%	+3.2%	+4.5%	-1.3%	-2.6%	-3.8%	+1.9%
증평군	14.6	13.8	15.5	14.3	13.3	15.5	14.8	15.6	14.0	14.6	14.4	14.8
		-5.5%	+6.2%	-2.1%	-8.9%	+6.2%	+1.4%	+6.8%	-4.1%	+0.0%	-1.4%	+1.4%
진천군	15.7	14.9	15.8	15.0	14.2	15.9	16.0	16.3	15.0	15.3	15.0	15.8
		-5.1%	+0.6%	-4.5%	-9.6%	+1.3%	+1.9%	+3.8%	-4.5%	-2.5%	-4.5%	+0.6%




표 3-36
충청북도의 호우일수(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1.8	2.6 +44.4%	2.4 +33.3%	1.1 -38.9%	2.3 +27.8%	2.5 +38.9%	2.1 +16.7%	2.7 +50.0%	2.4 +33.3%	2.5 +38.9%	2.0 +11.1%	2.4 +33.3%
제천시	2.1	3.2 +52.4%	3.0 +42.9%	1.1 -47.6%	2.4 +14.3%	2.9 +38.1%	2.7 +28.6%	3.8 +81.0%	2.8 +33.3%	3.1 +47.6%	2.2 +4.8%	3.1 +47.6%
청주시	1.6	1.7 +6.2%	1.9 +18.8%	0.8 -50.0%	1.7 +6.2%	1.8 +12.5%	1.2 -25.0%	2.3 +43.8%	1.8 +12.5%	1.8 +12.5%	1.4 -12.5%	1.8 +12.5%
충주시	1.9	2.4 +26.3%	3.0 +57.9%	0.9 -52.6%	2.0 +5.3%	2.1 +10.5%	2.3 +21.1%	3.2 +68.4%	2.3 +21.1%	2.7 +42.1%	1.7 -10.5%	2.6 +36.8%
괴산군	1.7	2.6 +52.9%	2.4 +41.2%	1.0 -41.2%	2.1 +23.5%	1.9 +11.8%	1.7 +0.0%	2.5 +47.1%	2.7 +58.8%	2.5 +47.1%	1.6 -5.9%	2.3 +35.3%
단양군	2.2	4.8 +118.2%	3.5 +59.1%	1.3 -40.9%	3.2 +45.5%	3.6 +63.6%	3.0 +36.4%	3.9 +77.3%	3.5 +59.1%	4.1 +86.4%	2.7 +22.7%	3.5 +59.1%
보은군	1.4	2.7 +92.9%	1.4 +0.0%	1.0 -28.6%	1.9 +35.7%	2.0 +42.9%	1.5 +7.1%	1.7 +21.4%	1.5 +7.1%	2.1 +50.0%	1.6 +14.3%	1.6 +14.3%
영동군	1.7	2.5 +47.1%	2.0 +17.6%	1.8 +5.9%	3.8 +123.5%	3.6 +111.8%	2.5 +47.1%	2.2 +29.4%	3.6 +111.8%	2.2 +29.4%	3.1 +82.4%	2.8 +64.7%
옥천군	1.4	2.2 +57.1%	1.4 +0.0%	0.8 -42.9%	1.9 +35.7%	2.2 +57.1%	1.8 +28.6%	1.4 +0.0%	1.6 +14.3%	1.8 +28.6%	1.6 +14.3%	1.6 +14.3%
음성군	1.9	2.2 +15.8%	3.2 +68.4%	1.0 -47.4%	2.3 +21.1%	2.1 +10.5%	1.9 +0.0%	3.0 +57.9%	1.8 -5.3%	2.7 +42.1%	1.8 -5.3%	2.2 +15.8%
증평군	1.7	1.6 -5.9%	2.4 +41.2%	1.0 -41.2%	2.3 +35.3%	1.8 +5.9%	1.4 -17.6%	2.7 +58.8%	2.6 +52.9%	2.0 +17.6%	1.7 +0.0%	2.2 +29.4%
진천군	1.8	1.6 -11.1%	2.0 +11.1%	0.9 -50.0%	1.6 -11.1%	1.8 +0.0%	1.3 -27.8%	2.4 +33.3%	1.5 -16.7%	1.8 +0.0%	1.5 -16.7%	1.8 +0.0%

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1.8	1.1	3.1	1.7	2.1	3.3	2.9	2.9	2.1	2.1	2.4	2.6
		-38.9%	+72.2%	-5.6%	+16.7%	+83.3%	+61.1%	+61.1%	+16.7%	+16.7%	+33.3%	+44.4%
제천시	2.1	1.6	3.4	2.1	2.1	3.9	3.3	3.2	2.3	2.5	2.7	2.9
		-23.8%	+61.9%	+0.0%	+0.0%	+85.7%	+57.1%	+52.4%	+9.5%	+19.0%	+28.6%	+38.1%
청주시	1.6	0.8	2.6	1.1	1.5	2.5	1.8	2.2	1.5	1.7	1.7	1.8
		-50.0%	+62.5%	-31.3%	-6.3%	+56.3%	+12.5%	+37.5%	-6.3%	+6.2%	+6.2%	+12.5%
충주시	1.9	1.2	2.5	1.6	1.5	3.4	2.8	2.7	1.9	1.9	2.2	2.4
		-36.8%	+31.6%	-15.8%	-21.1%	+78.9%	+47.4%	+42.1%	+0.0%	+0.0%	+15.8%	+26.3%
괴산군	1.7	1.0	3.3	1.4	1.9	3.5	2.3	3.0	1.7	2.1	2.3	2.3
		-41.2%	+94.1%	-17.6%	+11.8%	+105.9%	+35.3%	+76.5%	+0.0%	+23.5%	+35.3%	+35.3%
단양군	2.2	1.5	4.3	2.8	3.2	4.7	4.6	4.2	3.1	2.9	3.6	4.0
		-31.8%	+95.5%	+27.3%	+45.5%	+113.6%	+109.1%	+90.9%	+40.9%	+31.8%	+63.6%	+81.8%
보은군	1.4	0.9	2.8	1.3	1.7	2.5	2.2	2.0	1.4	1.8	1.9	1.9
		-35.7%	+100.0%	-7.1%	+21.4%	+78.6%	+57.1%	+42.9%	+0.0%	+28.6%	+35.7%	+35.7%
영동군	1.7	1.0	4.1	2.5	3.7	3.5	4.0	3.7	3.5	2.5	3.2	3.7
		-41.2%	+141.2%	+47.1%	+117.6%	+105.9%	+135.3%	+117.6%	+105.9%	+47.1%	+88.2%	+117.6%
옥천군	1.4	0.8	3.0	1.7	2.1	2.8	2.5	2.2	1.4	1.9	2.2	2.0
		-42.9%	+114.3%	+21.4%	+50.0%	+100.0%	+78.6%	+57.1%	+0.0%	+35.7%	+57.1%	+42.9%
음성군	1.9	1.2	2.3	1.3	1.5	3.4	3.0	2.4	2.5	1.8	2.0	2.6
		-36.8%	+21.1%	-31.6%	-21.1%	+78.9%	+57.9%	+26.3%	+31.6%	-5.3%	+5.3%	+36.8%
증평군	1.7	1.1	2.7	0.9	1.7	3.2	2.1	2.8	1.7	1.9	2.0	2.2
		-35.3%	+58.8%	-47.1%	+0.0%	+88.2%	+23.5%	+64.7%	+0.0%	+11.8%	+17.6%	+29.4%
진천군	1.8	1.1	1.7	1.0	1.3	2.5	2.1	2.0	1.6	1.4	1.6	1.9
		-38.9%	-5.6%	-44.4%	-27.8%	+38.9%	+16.7%	+11.1%	-11.1%	-22.2%	-11.1%	+5.6%

표 3-37
충청북도의 호우일수(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

그림 3-20
충청북도의 시군별
강수강도(㎜/일) 전망 분포도



0 10 20 Kilometers






그림 3-21
충청북도의 시군별
호우일수(일) 전망 분포도



● 2100년까지 5일최다강수량과 최대무강수지속기간 변화경향

- 5일최다강수량과 최대무강수지속기간의 변화는 극한기온지수에 비하여 변동성이 큼. 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0의 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 우리나라 평균이 증가하는 것과 같이 충청북도의 5일최다강수량과 최대무강수지속기간 모두 증가할 것으로 전망됨(표 3-39, 표 3-41).

※ 우리나라 평균 5일최다강수량 변화 : (2001~2010년) 240.7mm → (2071~2100년) 279.7mm(16% 증가)
우리나라 평균 최대무강수지속기간 변화 : (2001~2010년) 27.0일 → (2071~2100년) 30.5일(13% 증가)
- RCP6.0의 경우, 충청북도의 5일최다강수량은 21세기 후반기(2071~2100년)에 247.8mm로 현재(227.6mm) 대비 8.9% 증가하고, 최대무강수지속기간은 26.7일에서 31.2일로 16.9% 증가하는 것으로 나타남. 강수량 증가율(4.4%)에 비해 5일최다강수량과 최대무강수지속기간 모두 증가율이 크게 나타남.
- 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도에서 5일최다강수량이 증가하는 비율이 가장 큰 지역은 RCP6.0에서는 영동군(31.8%), RCP2.6에서도 영동군(23.2%)으로 나타났고, 최대무강수지속기간의 경우 RCP6.0에서는 제천시(25.1%), RCP2.6에서는 영동군(26.6%)에서 가장 큰 증가율을 보임.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 5일최다강수량은 증가율이 작아져(+8.9% → +1.2%) 더욱 줄어들고, 최대무강수지속기간도 증가율이 작아져(+16.9% → +15.0%) 더욱 짧아질 전망임 (표 3-38 ~ 표 3-41).

표 3-38

충청북도의 5일최다강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	227.6	216.7	221.2	189.1	241.8	217.2	230.5	232.3	228.4	219.0	216.0	230.4
		-4.8%	-2.8%	-16.9%	+6.2%	-4.6%	+1.3%	+2.1%	+0.4%	-3.8%	-5.1%	+1.2%
제천시	250.8	217.6	250.2	208.7	223.9	226.6	252.8	252.0	236.4	233.9	219.7	247.1
		-13.2%	-0.2%	-16.8%	-10.7%	-9.6%	+0.8%	+0.5%	-5.7%	-6.7%	-12.4%	-1.5%
청주시	217.0	192.0	199.7	167.9	205.6	188.3	206.6	207.8	215.7	195.9	187.3	210.0
		-11.5%	-8.0%	-22.6%	-5.3%	-13.2%	-4.8%	-4.2%	-0.6%	-9.7%	-13.7%	-3.2%
충주시	231.6	190.2	232.6	192.5	245.5	203.4	232.3	222.6	211.7	211.4	213.8	222.2
		-17.9%	+0.4%	-16.9%	+6.0%	-12.2%	+0.3%	-3.9%	-8.6%	-8.7%	-7.7%	-4.1%
괴산군	219.2	195.4	200.5	161.9	266.0	188.5	201.4	217.6	212.9	198.0	205.5	210.6
		-10.9%	-8.5%	-26.1%	+21.4%	-14.0%	-8.1%	-0.7%	-2.9%	-9.7%	-6.3%	-3.9%
단양군	249.0	268.8	259.4	198.3	268.9	229.8	259.4	250.0	255.0	264.1	232.3	254.8
		+8.0%	+4.2%	-20.4%	+8.0%	-7.7%	+4.2%	+0.4%	+2.4%	+6.1%	-6.7%	+2.3%
보은군	212.6	236.8	198.8	174.3	240.3	214.6	214.8	242.5	222.8	217.8	209.7	226.7
		+11.4%	-6.5%	-18.0%	+13.0%	+0.9%	+1.0%	+14.1%	+4.8%	+2.4%	-1.4%	+6.6%
영동군	212.1	251.2	213.7	226.3	260.2	283.2	246.8	258.3	278.9	232.4	256.6	261.3
		+18.4%	+0.8%	+6.7%	+22.7%	+33.5%	+16.4%	+21.8%	+31.5%	+9.6%	+21.0%	+23.2%
옥천군	213.2	211.6	180.2	192.1	206.6	216.5	218.5	219.3	213.0	195.9	205.1	216.9
		-0.8%	-15.5%	-9.9%	-3.1%	+1.5%	+2.5%	+2.9%	-0.1%	-8.1%	-3.8%	+1.7%
음성군	236.6	214.4	248.0	186.1	276.2	213.8	241.8	233.2	211.9	231.2	225.4	229.0
		-9.4%	+4.8%	-21.3%	+16.7%	-9.6%	+2.2%	-1.4%	-10.4%	-2.3%	-4.7%	-3.2%
증평군	218.6	175.7	189.7	155.5	207.6	183.6	196.8	191.2	199.2	182.7	182.2	195.7
		-19.6%	-13.2%	-28.9%	-5.0%	-16.0%	-10.0%	-12.5%	-8.9%	-16.4%	-16.7%	-10.5%
진천군	232.4	197.5	225.4	175.1	226.6	210.1	234.8	221.6	212.3	211.5	203.9	222.9
		-15.0%	-3.0%	-24.7%	-2.5%	-9.6%	+1.0%	-4.6%	-8.6%	-9.0%	-12.3%	-4.1%

표 3-39
충청북도의 5일최다강수량(mm) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	종반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	227.6	176.6	242.9	225.6	203.5	250.2	287.6	248.3	207.5	209.7	226.4	247.8
		-22.4%	+6.7%	-0.9%	-10.6%	+9.9%	+26.4%	+9.1%	-8.8%	-7.9%	-0.5%	+8.9%
제천시	250.8	199.7	252.9	211.2	203.3	298.6	303.4	253.5	212.5	226.3	237.7	256.5
		-20.4%	+0.8%	-15.8%	-18.9%	+19.1%	+21.0%	+1.1%	-15.3%	-9.8%	-5.2%	+2.3%
청주시	217.0	162.0	223.8	216.8	187.2	228.7	247.6	228.5	189.2	192.9	210.9	221.8
		-25.3%	+3.1%	-0.1%	-13.7%	+5.4%	+14.1%	+5.3%	-12.8%	-11.1%	-2.8%	+2.2%
충주시	231.6	181.2	218.8	194.7	176.0	258.6	261.5	238.4	197.1	200.0	209.8	232.3
		-21.8%	-5.5%	-15.9%	-24.0%	+11.7%	+12.9%	+2.9%	-14.9%	-13.6%	-9.4%	+0.3%
괴산군	219.2	157.1	210.8	207.7	187.1	223.5	248.1	218.2	177.5	183.9	206.1	214.6
		-28.3%	-3.8%	-5.2%	-14.6%	+2.0%	+13.2%	-0.5%	-19.0%	-16.1%	-6.0%	-2.1%
단양군	249.0	187.5	265.5	265.1	220.0	308.0	386.9	284.9	236.3	226.5	264.4	302.7
		-24.7%	+6.6%	+6.5%	-11.6%	+23.7%	+55.4%	+14.4%	-5.1%	-9.0%	+6.2%	+21.6%
보은군	212.6	166.3	259.9	238.9	197.3	235.1	271.8	260.9	193.9	213.1	223.8	242.2
		-21.8%	+22.2%	+12.4%	-7.2%	+10.6%	+27.8%	+22.7%	-8.8%	+0.2%	+5.3%	+13.9%
영동군	212.1	177.7	298.8	277.7	257.0	232.5	331.6	269.6	237.3	238.2	255.7	279.5
		-16.2%	+40.9%	+30.9%	+21.2%	+9.6%	+56.3%	+27.1%	+11.9%	+12.3%	+20.6%	+31.8%
옥천군	213.2	164.8	268.3	240.7	205.7	219.3	272.4	261.6	192.0	216.6	221.9	242.0
		-22.7%	+25.8%	+12.9%	-3.5%	+2.9%	+27.8%	+22.7%	-9.9%	+1.6%	+4.1%	+13.5%
음성군	236.6	185.7	221.2	207.4	190.3	242.1	277.7	244.4	243.4	203.4	213.3	255.2
		-21.5%	-6.5%	-12.3%	-19.6%	+2.3%	+17.4%	+3.3%	+2.9%	-14.0%	-9.8%	+7.9%
증평군	218.6	152.3	194.0	190.5	195.6	216.3	228.5	207.3	173.3	173.2	200.8	203.0
		-30.3%	-11.3%	-12.9%	-10.5%	-1.1%	+4.5%	-5.2%	-20.7%	-20.8%	-8.1%	-7.1%
진천군	232.4	189.8	209.1	195.7	222.1	236.6	275.1	231.5	208.9	199.4	218.1	238.5
		-18.3%	-10.0%	-15.8%	-4.4%	+1.8%	+18.4%	-0.4%	-10.1%	-14.2%	-6.2%	+2.6%

표 3-40
충청북도의
최대무강수지속기간(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP2.6)


	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	26.7	24.6	27.3	29.9	31.2	34.9	32.9	33.6	24.9	25.9	32.0	30.7
		-7.9%	+2.2%	+12.0%	+16.9%	+30.7%	+23.2%	+25.8%	-6.7%	-3.0%	+19.9%	+15.0%
제천시	25.9	23.3	29.1	32.2	33.3	38.3	32.4	34.7	24.9	26.2	34.6	30.9
		-10.0%	+12.4%	+24.3%	+28.6%	+47.9%	+25.1%	+34.0%	-3.9%	+1.2%	+33.6%	+19.3%
청주시	27.5	24.3	27.7	29.2	30.2	32.7	33.3	30.3	24.1	26.0	30.7	29.4
		-11.6%	+0.7%	+6.2%	+9.8%	+18.9%	+21.1%	+10.2%	-12.4%	-5.5%	+11.6%	+6.9%
충주시	27.6	21.8	25.8	29.2	31.0	34.4	30.0	31.4	23.1	23.8	31.5	28.3
		-21.0%	-6.5%	+5.8%	+12.3%	+24.6%	+8.7%	+13.8%	-16.3%	-13.8%	+14.1%	+2.5%
괴산군	26.8	26.4	28.5	30.8	31.9	36.0	33.9	31.0	25.7	27.5	32.9	30.3
		-1.5%	+6.3%	+14.9%	+19.0%	+34.3%	+26.5%	+15.7%	-4.1%	+2.6%	+22.8%	+13.1%
단양군	28.2	25.7	31.5	35.1	35.0	40.6	35.7	37.1	27.7	28.6	36.9	33.7
		-8.9%	+11.7%	+24.5%	+24.1%	+44.0%	+26.6%	+31.6%	-1.8%	+1.4%	+30.9%	+19.5%
보은군	25.0	23.0	24.7	28.5	26.9	32.9	31.7	31.4	22.7	23.9	29.4	28.8
		-8.0%	-1.2%	+14.0%	+7.6%	+31.6%	+26.8%	+25.6%	-9.2%	-4.4%	+17.6%	+15.2%
영동군	25.9	26.3	25.1	24.9	28.8	33.5	32.7	40.0	24.9	25.7	29.1	32.8
		+1.5%	-3.1%	-3.9%	+11.2%	+29.3%	+26.3%	+54.4%	-3.9%	-0.8%	+12.4%	+26.6%
옥천군	26.5	25.3	24.1	28.6	28.5	34.1	33.4	37.4	26.0	24.7	30.4	32.5
		-4.5%	-9.1%	+7.9%	+7.5%	+28.7%	+26.0%	+41.1%	-1.9%	-6.8%	+14.7%	+22.6%
음성군	26.1	25.1	28.0	30.6	34.1	32.7	33.5	32.7	25.5	26.6	32.5	30.7
		-3.8%	+7.3%	+17.2%	+30.7%	+25.3%	+28.4%	+25.3%	-2.3%	+1.9%	+24.5%	+17.6%
증평군	29.9	29.1	32.5	35.6	36.5	39.2	39.2	35.2	27.8	30.8	37.1	34.3
		-2.7%	+8.7%	+19.1%	+22.1%	+31.1%	+31.1%	+17.7%	-7.0%	+3.0%	+24.1%	+14.7%
진천군	25.2	24.6	26.3	27.6	30.5	29.8	32.4	29.2	24.1	25.5	29.3	28.8
		-2.4%	+4.4%	+9.5%	+21.0%	+18.3%	+28.6%	+15.9%	-4.4%	+1.2%	+16.3%	+14.3%

표 3-41
충청북도의
최대무강수지속기간(일) 전망과
현재 기후값 대비 변화율(%)
(RCP6.0)

	2001 ~2010	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	26.7	25.4	26.4	27.9	30.6	37.4	31.3	29.1	33.2	25.9	32.0	31.2
		-4.9%	-1.1%	+4.5%	+14.6%	+40.1%	+17.2%	+9.0%	+24.3%	-3.0%	+19.9%	+16.9%
제천시	25.9	26.0	25.1	30.2	32.2	40.0	31.8	30.6	35.1	25.6	34.1	32.4
		+0.4%	-3.1%	+16.6%	+24.3%	+54.4%	+22.8%	+18.1%	+35.5%	-1.2%	+31.7%	+25.1%
청주시	27.5	25.8	26.8	25.6	30.1	35.4	30.8	28.1	32.3	26.3	30.4	30.3
		-6.2%	-2.5%	-6.9%	+9.5%	+28.7%	+12.0%	+2.2%	+17.5%	-4.4%	+10.5%	+10.2%
충주시	27.6	24.5	23.8	27.1	29.0	38.3	29.2	28.9	32.6	24.1	31.4	30.2
		-11.2%	-13.8%	-1.8%	+5.1%	+38.8%	+5.8%	+4.7%	+18.1%	-12.7%	+13.8%	+9.4%
괴산군	26.8	26.4	25.4	28.7	31.1	36.4	31.1	29.2	35.3	25.9	32.1	31.8
		-1.5%	-5.2%	+7.1%	+16.0%	+35.8%	+16.0%	+9.0%	+31.7%	-3.4%	+19.8%	+18.7%
단양군	28.2	25.6	26.9	32.9	31.6	39.5	35.1	30.1	36.9	26.2	34.7	33.9
		-9.2%	-4.6%	+16.7%	+12.1%	+40.1%	+24.5%	+6.7%	+30.9%	-7.1%	+23.0%	+20.2%
보은군	25.0	22.5	24.6	24.7	28.6	35.7	28.5	26.8	28.9	23.5	29.7	28.1
		-10.0%	-1.6%	-1.2%	+14.4%	+42.8%	+14.0%	+7.2%	+15.6%	-6.0%	+18.8%	+12.4%
영동군	25.9	24.5	30.6	26.2	32.6	38.9	31.8	28.6	31.1	27.5	32.6	30.5
		-5.4%	+18.1%	+1.2%	+25.9%	+50.2%	+22.8%	+10.4%	+20.1%	+6.2%	+25.9%	+17.8%
옥천군	26.5	24.5	28.5	25.3	32.5	39.5	33.0	28.7	30.1	26.5	32.5	30.6
		-7.5%	+7.5%	-4.5%	+22.6%	+49.1%	+24.5%	+8.3%	+13.6%	+0.0%	+22.6%	+15.5%
음성군	26.1	27.9	26.8	29.5	28.9	35.4	31.4	31.0	34.8	27.3	31.3	32.3
		+6.9%	+2.7%	+13.0%	+10.7%	+35.6%	+20.3%	+18.8%	+33.3%	+4.6%	+19.9%	+23.8%
증평군	29.9	29.6	29.9	30.6	34.9	42.2	36.4	33.3	39.1	29.8	35.9	36.2
		-1.0%	+0.0%	+2.3%	+16.7%	+41.1%	+21.7%	+11.4%	+30.8%	-0.3%	+20.1%	+21.1%
진천군	25.2	26.1	25.6	27.5	26.5	31.0	30.1	27.9	33.5	25.8	28.4	30.4
		+3.6%	+1.6%	+9.1%	+5.2%	+23.0%	+19.4%	+10.7%	+32.9%	+2.4%	+12.7%	+20.6%

그림 3-22

충청북도의 시군별 5일최다강수량(mm)
전망 분포도






그림 3-23
충청북도의 시군별
최대무강수자속기간(일) 전망 분포도



3. 계절길이

- 현재 충청북도의 여름은 98일(6월 7일 ~ 9월 12일) 동안 지속됨. RCP6.0 시나리오에서 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 여름은 121일(5월 26일 ~ 9월 23일)로 현재보다 23일 늘어나지만 RCP2.6 시나리오에서는 109일(6월 1일 ~ 9월 17일)로 증가폭이 11일에 그칠 것으로 전망됨(표 3-42).
- RCP6.0 시나리오에 의한 충청북도의 계절길이 변화 전망
 - 봄은 21세기 후반기(2071~2100년)에 시작일이 빨라지나 종료일이 더 빨라져 계절길이는 76일로, 현재의 81일보다 5일 짧아짐.
 - 여름은 점점 더 길어져 21세기 후반기(2071~2100년)에 시작일이 현재보다 12일 빨라지고 계절길이는 23일 더 길어짐.
 - 가을은 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 시작일은 늦어지나 종료일도 늦어져 계절길이의 변화가 작음.
 - 겨울은 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 시작일이 늦어지면서 계절길이가 급격히 짧아짐.
- RCP2.6 시나리오에 의한 충청북도의 계절길이 변화 전망
 - 봄철은 21세기 전반기(2021~2040년)부터 후반기까지 계절길이의 변화가 거의 없음.
 - 여름은 21세기 후반기(2071~2100년)에 현재보다 11일 길어지나 전반기와 비교하면 2일 감소에 그침.
 - 가을은 길이의 변화가 21세기 전반기(2021~2040년), 중반기(2041~2070년)에 거의 없으며 후반기(2071~2100년)에 급격하게 늘어남.
 - 겨울은 21세기 전반기(2021~2040년)에서 후반기(2071~2100년)로 갈수록 시작일이 늦어지고 종료일에 거의 변화가 없어 계절길이가 증가하는 경향을 보임.

표 3-42
충청북도의 계절길이
(계절시작일) 변화 전망

계절	현재 (2001~2010)	시나리오	전반기 (2021~2040)	중반기 (2041~2070)	후반기 (2071~2100)
봄	81 (3월 18일)	RCP2.6	77 (3월14일)	76 (3월13일)	78 (3월15일)
		RCP6.0	81 (3월15일)	82 (3월13일)	76 (3월11일)
여름	98 (6월 7일)	RCP2.6	111 (5월30일)	114 (5월28일)	109 (6월1일)
		RCP6.0	100 (6월4일)	107 (6월3일)	121 (5월26일)
가을	63 (9월 13일)	RCP2.6	58 (9월18일)	59 (9월19일)	71 (9월18일)
		RCP6.0	64 (9월12일)	72 (9월18일)	68 (9월24일)
겨울	123 (11월 15일)	RCP2.6	119 (11월15일)	116 (11월17일)	107 (11월28일)
		RCP6.0	120 (11월15일)	104 (11월29일)	100 (12월1일)

제4장 분야별 응용정보

1. 에너지(냉방도일, 난방도일)

● 2100년까지 냉방도일과 난방도일 변화경향

- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 충청북도에서 139% 증가하고, 난방도일은 14% 감소하여 냉방도일의 증가폭이 난방도일의 감소폭보다 클 것으로 전망됨(표 4-2, 표 4-4).
- RCP2.6에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 충청북도에서 25% 증가하고, 난방도일은 2% 감소하여 냉방도일의 증가폭이 난방도일의 감소폭보다 클 것으로 전망됨(표 4-1, 표 4-3).
- RCP6.0의 경우 월별 냉방도일에서 냉방이 많이 필요한 7월과 8월의 냉방도일은 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 10월에도 냉방이 필요해질 것으로 전망됨.
- 냉방도일의 증가율이 난방도일의 감소율보다 크므로 냉방으로 인한 에너지 증가에 대비가 필요할 것으로 보임.

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 냉방도일 증가폭이 114% 줄어들고, 난방도일 감소폭은 12% 줄어들 것으로 전망됨(표 4-1 ~ 표 4-4).




그림 4-1
충청북도의 월별 냉방도일(도일) 전망




그림 4-2
충청북도의 월별 난방도일(도일) 전망

표 4-1
충청북도의 냉방도일(도일) 전망
(RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	75.0	118.8	125.0	154.6	113.4	95.3	127.6	140.9	96.9	131.0	121.3
제천시	56.6	93.4	102.1	131.0	89.2	73.0	101.4	116.4	75.0	107.4	96.9
청주시	111.7	168.1	174.2	207.9	162.7	139.1	176.1	192.6	139.9	181.6	169.3
충주시	83.0	129.4	137.2	169.9	123.7	102.9	137.5	152.8	106.2	143.6	131.1
괴산군	62.1	102.8	107.8	137.2	96.1	80.6	111.8	122.9	82.5	113.7	105.1
단양군	30.1	54.0	63.5	85.4	52.4	41.0	61.9	74.1	42.1	67.1	59.0
보은군	83.5	132.2	135.0	167.2	124.7	107.1	142.0	154.2	107.9	142.3	134.4
영동군	58.7	97.7	101.5	125.9	93.2	79.0	109.3	118.1	78.2	106.9	102.1
옥천군	92.9	145.5	147.5	179.7	138.6	119.1	156.7	169.2	119.2	155.3	148.3
음성군	89.8	138.9	146.1	177.6	132.1	110.5	146.1	160.5	114.4	151.9	139.0
증평군	96.2	148.2	153.8	186.5	141.3	119.6	155.6	169.9	122.2	160.5	148.4
진천군	98.6	149.8	157.0	188.1	143.3	120.4	156.6	172.0	124.2	162.8	149.7

표 4-2
충청북도의 냉방도일(도일) 전망
(RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	81.4	91.1	112.7	139.9	154.5	163.4	196.4	257.9	86.3	135.7	205.9
제천시	61.4	71.7	91.6	122.7	128.8	138.4	165.1	220.3	66.6	114.4	174.6
청주시	124.1	132.5	153.0	184.2	204.5	218.2	259.3	331.5	128.3	180.6	269.7
충주시	91.4	102.4	121.6	156.5	166.4	177.7	212.2	274.6	96.9	148.2	221.5
괴산군	67.3	77.2	97.3	124.9	136.4	144.8	176.3	234.3	72.3	119.5	185.1
단양군	30.8	37.0	59.0	80.7	85.9	92.5	112.7	157.5	33.9	75.2	120.9
보은군	87.9	99.0	125.0	148.8	168.2	176.7	211.2	278.3	93.5	147.3	222.1
영동군	59.1	70.7	98.6	110.6	134.5	136.3	166.1	227.4	64.9	114.6	176.6
옥천군	97.3	109.6	139.0	159.0	185.6	190.5	226.7	299.7	103.5	161.2	239.0
음성군	102.1	110.4	126.5	161.4	174.5	186.0	225.5	287.7	106.3	154.1	233.1
증평군	108.3	117.2	133.8	167.0	182.9	195.5	235.2	301.0	112.8	161.2	243.9
진천군	112.8	119.1	133.7	169.0	184.4	197.4	239.8	302.6	116.0	162.4	246.6

그림 4-3
충청북도의 시군별
냉방도일(도일) 전망 분포도





표 4-3
충청북도의 난방도일(도일) 전망
(RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	2902.7	2834.1	2862.8	2777.8	2861.5	2835.4	2814.4	2810.9	2868.4	2834.0	2820.2
제천시	3061.2	2996.2	3034.7	2939.6	3021.6	2994.7	2966.0	2978.4	3028.7	2998.6	2979.7
청주시	2694.2	2623.9	2646.0	2569	2653.0	2631	2612.6	2598.7	2659.1	2622.7	2614.1
충주시	2909.6	2841.2	2880.8	2792.3	2871.2	2842.3	2821.5	2825.8	2875.4	2848.1	2829.9
괴산군	2950.3	2881.4	2908.3	2824.5	2907.3	2878.9	2857.1	2854.5	2915.9	2880.0	2863.5
단양군	3225.3	3158.6	3195.0	3096.7	3185	3155.5	3128.6	3138.3	3192.0	3158.9	3140.8
보은군	2794.0	2722.1	2743.4	2666.6	2747.9	2727.4	2704.9	2692.9	2758.1	2719.3	2708.4
영동군	2903.9	2840.4	2851.7	2774.3	2860.9	2836.2	2820.0	2802.4	2872.2	2829.0	2819.5
옥천군	2737.7	2666.3	2687.1	2607.1	2690.2	2673.7	2652.3	2637.8	2702.0	2661.5	2654.6
음성군	2845.3	2773.4	2812.1	2724.9	2810.0	2777.2	2761.9	2761.1	2809.4	2782.3	2766.7
증평군	2787.5	2716.4	2743.0	2664.5	2747.8	2720.8	2703.8	2695.0	2752	2718.4	2706.5
진천군	2775.9	2703.9	2734.0	2650.7	2739.6	2709.1	2694.9	2688.5	2739.9	2708.1	2697.5

표 4-4
충청북도의 난방도일(도일) 전망
(RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	3090.1	2900.5	2918.0	2920.1	2742.9	2749.9	2527.4	2421.4	2995.3	2860.3	2566.2
제천시	3253.3	3056.2	3080.7	3081.7	2893.3	2902.6	2669.2	2567.8	3154.8	3018.6	2713.2
청주시	2876.8	2694.6	2705.1	2712.4	2548.6	2550.9	2344.2	2236.6	2785.7	2655.4	2377.2
충주시	3093.8	2904.6	2923.7	2925.6	2750.5	2756.3	2532.9	2433.9	2999.2	2866.6	2574.4
괴산군	3133.4	2947.7	2962.7	2965.8	2787.8	2793.0	2568.0	2461.9	3040.6	2905.4	2607.6
단양군	3426.0	3225.1	3251.2	3246.0	3046.5	3057.0	2814.6	2705.9	3325.6	3181.2	2859.2
보은군	2977.8	2791.1	2805.7	2811.4	2638.4	2645.4	2430.6	2321.1	2884.5	2751.8	2465.7
영동군	3096.7	2901.4	2923.6	2920.1	2740.1	2754.9	2528.5	2413.3	2999.1	2861.3	2565.6
옥천군	2921.3	2734.0	2748.3	2751.7	2582.2	2594.0	2380.5	2269.3	2827.7	2694.1	2414.6
음성군	3030.2	2845.3	2858.2	2862.2	2692.9	2693.9	2476.0	2376.3	2937.8	2804.4	2515.4
증평군	2968.7	2787.6	2798.2	2804.7	2637.0	2635.4	2426.3	2322.7	2878.2	2746.6	2461.5
진천군	2959.8	2778.8	2787.5	2794.5	2628.3	2626.5	2414.9	2312.2	2869.3	2736.8	2451.2

그림 4-4
충청북도의 시군별
난방도일(도일) 전망 분포도



2. 보건(열지수, 불쾌지수)

● 2100년까지 열지수와 불쾌지수 변화경향

- RCP6.0에 따르면 충청북도의 열지수는 21세기 전반기(2021~2040년)와 중반기(2041~2070년), 후반기(2071~2100년) 전 기간 동안 ‘보통’ 범위에 속할 것으로 전망됨(표 4-5, 표 4-8).
- 충청북도의 불쾌지수는 21세기 전반기(2021~2040년)에 ‘높음’ 범위에, 21세기 중반기(2041~2070년)와 후반기(2071~2100년)에는 ‘매우 높음’ 범위에 속할 것으로 전망됨(표 4-6, 표 4-10).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 열지수 증가폭은 13% 감소되고, 불쾌지수의 경우 4% 줄어들 전망임(표 4-7 ~ 표 4-10).

32미만	32~41	41~54	54~66	66이상
낮음	보통	높음	매우 높음	위험
일반적으로 위험수준은 낮으나 수분섭취 등 건강관리에 유의해야 함.	열사병, 열경련 가능성이 있음.	열사병, 열경련 가능성이 높아지므로 오후 12~5시에는 야외활동을 자제해야 함.	계속된 노출에 의해 어지러움, 근육경련, 의식저하 등의 증상이 발생할 수 있음. 가급적 야외 활동을 중단해야 함.	

표 4-5
열지수 기준범위

68 미만	68~75	75~80	80 이상
낮음	보통	높음	매우 높음
전원 쾌적함을 느낌.	불쾌감을 나타내기 시작함.	50% 정도 불쾌감을 느낌. 어린이, 노약자 등은 오후 12~5시에는 야외활동을 자제해야 함.	전원 불쾌감을 느낌. 어린이, 노약자 등은 야외활동을 자제해야 함.

표 4-6
불쾌지수 기준범위

표 4-7
충청북도의 열지수 전망 (RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	33.0	35.0	35.2	36.5	34.8	33.7	35.3	35.7	34.0	35.5	34.9
제천시	31.3	33.0	33.4	34.6	32.9	31.8	33.3	33.7	32.2	33.6	32.9
청주시	34.1	36.2	36.4	37.7	35.9	34.9	36.5	36.9	35.2	36.7	36.1
충주시	34.0	35.9	36.2	37.6	35.7	34.6	36.2	36.7	35.0	36.5	35.8
괴산군	32.4	34.3	34.5	35.8	34.1	33.1	34.6	35.0	33.4	34.8	34.2
단양군	30.1	31.8	32.2	33.4	31.7	30.7	32.1	32.5	31.0	32.4	31.8
보은군	32.5	34.5	34.6	35.9	34.3	33.4	34.8	35.2	33.5	34.9	34.5
영동군	32.1	34.2	34.1	35.3	33.9	32.9	34.5	35.0	33.2	34.4	34.1
옥천군	34.0	36.2	36.2	37.5	35.9	34.9	36.6	37.0	35.1	36.5	36.2
음성군	34.4	36.4	36.7	38.1	36.2	35.0	36.7	37.1	35.4	37.0	36.3
증평군	34.5	36.6	36.8	38.1	36.3	35.2	36.9	37.3	35.6	37.1	36.5
진천군	34.1	36.1	36.3	37.6	35.8	34.7	36.4	36.7	35.1	36.6	35.9

표 4-8
충청북도의 열지수 전망 (RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	32.4	32.6	33.4	34.6	35.3	35.9	37.2	39.6	32.5	34.4	37.6
제천시	30.7	30.8	31.5	33.0	33.4	34.0	35.2	37.4	30.8	32.6	35.5
청주시	33.5	33.7	34.5	35.7	36.4	37.1	38.5	41.0	33.6	35.5	38.9
충주시	33.4	33.6	34.3	35.8	36.3	37.0	38.5	40.7	33.5	35.5	38.7
괴산군	31.7	31.9	32.7	34.0	34.6	35.1	36.5	38.8	31.8	33.8	36.8
단양군	29.4	29.6	30.4	31.7	32.2	32.6	33.8	36.0	29.5	31.4	34.1
보은군	31.6	31.9	32.9	33.8	34.6	35.1	36.4	38.8	31.8	33.8	36.8
영동군	31.0	31.5	32.7	33.2	34.4	34.6	35.9	38.4	31.3	33.4	36.3
옥천군	33.0	33.4	34.5	35.3	36.3	36.7	38.0	40.6	33.2	35.4	38.4
음성군	34.0	34.1	34.8	36.2	36.8	37.5	39.1	41.4	34.1	35.9	39.3
증평군	33.9	34.1	34.9	36.2	36.9	37.6	39.0	41.5	34.0	36.0	39.4
진천군	33.8	33.8	34.5	35.9	36.4	37.1	38.7	41.1	33.8	35.6	39.0

그림 4-5
충청북도의 시군별
열지수 전망 분포도





표 4-9
충청북도의 불쾌지수 전망
(RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	80.0	81.1	81.2	81.9	81.0	80.4	81.3	81.4	80.6	81.4	81.0
제천시	78.8	80.0	80.1	80.9	79.8	79.2	80.1	80.3	79.4	80.3	79.9
청주시	80.6	81.8	81.9	82.6	81.6	81.1	82.0	82.1	81.2	82.0	81.7
충주시	80.6	81.7	81.8	82.5	81.5	80.9	81.8	82.0	81.2	81.9	81.6
괴산군	79.6	80.7	80.8	81.5	80.6	80.0	80.9	81.0	80.2	81.0	80.6
단양군	78.1	79.2	79.4	80.1	79.1	78.5	79.3	79.5	78.7	79.5	79.1
보은군	79.6	80.8	80.8	81.6	80.7	80.2	81.0	81.2	80.2	81.0	80.8
영동군	79.3	80.7	80.6	81.2	80.4	79.9	80.8	81.0	80.0	80.7	80.6
옥천군	80.6	81.8	81.8	82.5	81.6	81.1	82.0	82.2	81.2	82.0	81.8
음성군	80.9	81.9	82.1	82.8	81.8	81.2	82.1	82.2	81.4	82.2	81.8
증평군	80.9	82.1	82.1	82.8	81.9	81.3	82.2	82.3	81.5	82.3	81.9
진천군	80.7	81.8	81.9	82.6	81.6	81.0	81.9	82.0	81.3	82.0	81.6

표 4-10
충청북도의 불쾌지수 전망
(RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	79.3	79.6	80.1	80.7	81.2	81.6	82.4	83.6	79.5	80.7	82.5
제천시	78.2	78.5	78.9	79.7	80.1	80.5	81.3	82.5	78.4	79.6	81.4
청주시	80.1	80.3	80.8	81.4	81.9	82.3	83.1	84.4	80.2	81.4	83.3
충주시	80.0	80.2	80.6	81.4	81.8	82.3	83.1	84.2	80.1	81.3	83.2
괴산군	78.9	79.2	79.6	80.3	80.8	81.2	82.0	83.2	79.1	80.2	82.1
단양군	77.3	77.6	78.1	78.8	79.3	79.7	80.5	81.7	77.5	78.7	80.6
보은군	78.8	79.1	79.7	80.2	80.8	81.1	81.9	83.2	79.0	80.2	82.1
영동군	78.4	78.9	79.6	79.8	80.6	80.8	81.6	83.0	78.7	80.0	81.8
옥천군	79.7	80.1	80.7	81.1	81.8	82.1	82.8	84.2	79.9	81.2	83.0
음성군	80.4	80.6	81.0	81.7	82.2	82.5	83.4	84.6	80.5	81.6	83.5
증평군	80.4	80.6	81.0	81.7	82.2	82.6	83.4	84.6	80.5	81.6	83.5
진천군	80.2	80.4	80.8	81.5	81.9	82.3	83.2	84.4	80.3	81.4	83.3

그림 4-6
충청북도의 시군별
불쾌지수 전망 분포도



3. 농업(생육도일, 유효적산온도)

● 2100년까지 생육도일과 유효적산온도 변화경향

- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 두 지수 동일하게 22%로 전망됨(표 4-13, 표 4-15).
- RCP2.6에서 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 두 지수 동일하게 4%로 전망됨(표 4-12, 표 4-14).
- RCP6.0에서 21세기 전반기(2021~2040년) 충청북도의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 1,959.7도일, 1,931.8°C로 감자 재배에 적합할 것으로 전망됨.
- 21세기 중반기(2041~2070년) 충청북도의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,112.8도일, 2,079.9°C로 증가하여 전반기와 마찬가지로 감자 재배에 적합할 것으로 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 생육한계온도 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,397.5도일, 2,360.5°C로 더 이상 감자 재배에 적합하지 않을 것으로 보임(표 4-11).

● 온실가스 감축정책 실현정도 비교

- 온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는(RCP6.0) 경우와 비교하면 온실가스 감축으로 지구 스스로가 회복 가능한(RCP2.6) 경우, 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 10°C 기준 생육도일 증가폭은 18% 줄어들고, 유효적산온도의 증가폭도 18% 줄어들 전망임(표 4-12 ~ 표 4-15).

작물명	생육도일	유효적산온도($T_b=10^{\circ}\text{C}$)
벼		2,500 ~ 4,000°C 재배 북한계 2,000°C 2기작 한계 4,500°C 3기작 한계 7,000°C
보리	1,270 ~ 1,520도일($T_b=0^{\circ}\text{C}$)	800 ~ 1,600°C
밀	1,540 ~ 1,670도일($T_b=0^{\circ}\text{C}$) 1,550 ~ 1,680도일($T_b=10^{\circ}\text{C}$)	
감자		1,000 ~ 2,200°C
포도		2,500 ~ 3,600°C
사과	1,300도일($T_b=10^{\circ}\text{C}$)	
수수		2,800 ~ 3,400°C
감귤류		4,000 ~ 4,500°C

표 4-11
작물별 생육도일 및 유효적산온도

표 4-12

충청북도의 10°C 기준
생육도일(도일) 전망
(RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1960.0	2091.3	2111.2	2172.0	2111.5	2051.1	2134.5	2128.2	2025.7	2131.6	2104.6
제천시	1863.4	1988.1	2007.6	2077.1	2010.3	1946.6	2027.8	2023.3	1925.8	2031.7	1999.2
청주시	2146.3	2281.5	2309.9	2363.6	2301.6	2244.7	2331.1	2323.9	2213.9	2325.0	2299.9
충주시	1998.2	2126.5	2148.0	2216.7	2147.6	2085.0	2169.4	2160.3	2062.4	2170.8	2138.2
괴산군	1906.3	2037.8	2052.8	2118.4	2057.9	1997.8	2082.8	2072.3	1972.1	2076.4	2051.0
단양군	1701.5	1826.4	1839.7	1909.4	1846.9	1781.3	1859.9	1860.5	1764.0	1865.3	1833.9
보은군	2010.6	2150.0	2167.0	2223.3	2167.2	2111.8	2195.9	2190.9	2080.3	2185.8	2166.2
영동군	1878.9	2014.3	2029.3	2075.4	2036.5	1974.7	2054.1	2051.0	1946.6	2047.1	2026.6
옥천군	2044.9	2187.0	2207.2	2257.3	2205.5	2147.3	2232.6	2228.5	2116.0	2223.3	2202.8
음성군	2049.8	2176.9	2200.9	2265.1	2195.1	2135.8	2221.9	2210.4	2113.4	2220.4	2189.4
증평군	2078.9	2210.6	2235.0	2294.9	2230.3	2172.4	2258.3	2248.3	2144.8	2253.4	2226.3
진천군	2098.5	2226.2	2254.2	2312.7	2244.8	2187.4	2273.4	2264.1	2162.4	2270.6	2241.6

표 4-13

충청북도의 10°C 기준
생육도일(도일) 전망
(RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1924.4	1994.9	2063.8	2068.5	2206.0	2280.4	2377.0	2535.0	1959.7	2112.8	2397.5
제천시	1828.2	1896.7	1961.7	1977.7	2103.2	2179.4	2272.7	2420.6	1862.5	2014.2	2290.9
청주시	2116.2	2184.6	2251.6	2255.2	2395.7	2477.8	2578.8	2745.9	2150.4	2300.8	2600.8
충주시	1969.4	2035.7	2101.3	2115.4	2243.2	2322.1	2421.3	2574.3	2002.6	2153.3	2439.2
괴산군	1871.0	1939.1	2008.0	2015.1	2148.7	2224.4	2320.8	2476.6	1905.1	2057.3	2340.6
단양군	1658.1	1724.4	1795.6	1809.3	1937.8	2003.7	2094.8	2238.8	1691.3	1847.6	2112.4
보은군	1973.2	2047.8	2120.4	2117.2	2263.4	2337.8	2431.2	2597.6	2010.5	2167.0	2455.5
영동군	1827.0	1915.1	1991.4	1971.7	2132.5	2192.8	2282.9	2448.9	1871.1	2031.9	2308.2
옥천군	2006.4	2086.2	2162.6	2149.9	2307.1	2374.6	2467.2	2642.6	2046.3	2206.5	2494.8
음성군	2024.7	2085.7	2149.3	2162.2	2291.0	2372.0	2477.6	2632.4	2055.2	2200.8	2494.0
증평군	2050.2	2116.5	2179.0	2188.4	2322.1	2406.8	2508.7	2667.3	2083.4	2229.8	2527.6
진천군	2073.8	2133.9	2196.1	2208.1	2338.9	2423.2	2530.2	2687.4	2103.9	2247.7	2546.9




그림 4-7
충청북도의 시군별
생육도일(10°C)(도일) 전망 분포도



표 4-14

충청북도의 10°C 기준
유효적산온도(°C) 전망
(RCP2.6)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1935.7	2059.5	2081.7	2146.5	2076.6	2019.6	2103.7	2098.1	1997.6	2101.6	2073.8
제천시	1840.0	1959.4	1979.2	2052.5	1977.1	1918.0	1998.7	1995.3	1899.7	2002.9	1970.7
청주시	2113.6	2238.1	2270.7	2329.1	2257.4	2202.6	2290.3	2283.5	2175.9	2285.7	2258.8
충주시	1972.3	2094.5	2117.2	2189.7	2111.3	2053.4	2137.5	2128.7	2033.4	2139.4	2106.5
괴산군	1889.2	2013.2	2031.5	2100.6	2029.5	1973.7	2058.0	2049.5	1951.2	2053.9	2027.1
단양군	1680.0	1800.0	1814.7	1887.6	1816.4	1757.0	1834.4	1836.7	1740.0	1839.6	1809.4
보은군	1990.4	2119.9	2141.1	2202.5	2135.5	2082.9	2168.5	2162.9	2055.2	2159.7	2138.1
영동군	1861.0	1988.9	2005.7	2055.6	2007.3	1948.0	2029.7	2027.4	1925.0	2022.9	2001.7
옥천군	2024.7	2157.1	2180.2	2235.2	2173.8	2117.8	2205.7	2200.2	2090.9	2196.4	2174.6
음성군	2017.8	2137.9	2164.3	2232.6	2153.4	2096.8	2183.6	2173.3	2077.9	2183.4	2151.2
증평군	2047.9	2170.9	2198.6	2262.8	2188.4	2132.5	2219.1	2210.6	2109.4	2216.6	2187.4
진천군	2062.4	2180.6	2211.8	2274.7	2197.2	2141.2	2229.3	2221.2	2121.5	2227.9	2197.2

표 4-15

충청북도의 10°C 기준
유효적산온도(°C) 전망
(RCP6.0)

	2021 ~2030	2031 ~2040	2041 ~2050	2051 ~2060	2061 ~2070	2071 ~2080	2081 ~2090	2091 ~2100	전반기 (2021 ~2040)	중반기 (2041 ~2070)	후반기 (2071 ~2100)
충청북도	1900.2	1963.3	2031.3	2036.2	2172.2	2244.5	2340.5	2496.6	1931.8	2079.9	2360.5
제천시	1804.9	1867.8	1931.7	1947.7	2073.3	2145.3	2236.7	2384.4	1836.4	1984.2	2255.5
청주시	2083.8	2142.3	2208.2	2211.8	2349.3	2431.5	2533.3	2695.3	2113.1	2256.4	2553.4
충주시	1944.2	2003.9	2067.8	2081.5	2209.1	2284.5	2382.9	2534.3	1974.1	2119.5	2400.6
괴산군	1854.9	1915.1	1983.0	1989.8	2122.6	2197.3	2291.9	2446.5	1885.0	2031.8	2311.9
단양군	1637.5	1699.0	1769.4	1783.7	1912.1	1973.5	2062.6	2207.2	1668.3	1821.7	2081.1
보은군	1951.1	2018.6	2090.3	2088.1	2231.8	2305.9	2399.7	2564.0	1984.9	2136.7	2423.2
영동군	1807.5	1888.4	1965.4	1947.7	2104.7	2162.8	2253.2	2418.6	1848.0	2005.9	2278.2
옥천군	1983.7	2056.8	2132.6	2121.4	2274.7	2340.8	2435.3	2607.7	2020.3	2176.2	2461.3
음성군	1995.2	2046.9	2109.6	2120.9	2249.2	2327.7	2433.3	2583.3	2021.1	2159.9	2448.1
증평군	2021.8	2077.6	2139.3	2147.3	2279.6	2362.9	2464.6	2619.2	2049.7	2188.7	2482.2
진천군	2038.9	2088.4	2149.2	2160.0	2288.8	2372.4	2480.4	2631.0	2063.7	2199.3	2494.6




그림 4-8
충청북도의 시군별
유효적온온도(10°C)($^{\circ}\text{C}$) 전망 분포도




제5장 결론

- 충청북도는 우리나라 평균과 비교해 일평균/일최고/일최저기온이 모두 낮음. 온실가스 저감정책이 어느 정도 실현되는 RCP6.0 시나리오의 경우 충청북도의 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 연평균기온의 상승폭은 우리나라 평균(+2.4°C)보다 0.2°C 더 작고, 폭염일수의 증가폭은 6.0일 더 크며 열대야일수의 증가폭은 8.0일 더 작을 것으로 전망됨. 충청북도 내 각 시군별 기온 차이는 최대 1.8°C로 지역적인 차이가 크고, 21세기 후반기(2071~2100년)에 지역별로 비슷한 정도(+2.2~+2.3°C)로 기온이 상승할 것으로 전망됨.
 - 충청북도는 지형의 기복이 심하여 시·군별 기온차이가 큼. 동쪽의 고도가 높은 단양군과 제천시의 기온이 낮고 서쪽에 위치해 비교적 고도가 낮은 청주시, 옥천군 등의 기온이 높게 나타남. 현재 기온이 높은 지역의 기온이 미래에도 높고, 현재 기온이 낮은 지역의 기온이 미래에도 낮게 나타남.
 - 현재 충청북도 내 각 시군별 일최고기온 차이는 최대 1.9°C, 일최저기온 차이는 최대 2.1°C이고 폭염일수는 옥천군에서 가장 많으나 미래에는 증평군에서 가장 많을 것으로 전망됨.
 - 현재 열대야일수는 다른 지역에 비해 최저기온이 높은 청주시에서 가장 많이 발생하고 미래에도 다른 지역에 비해 많을 것으로 전망됨.
 - 현재 한파일수는 제천시에서 가장 많으며 미래에도 제천시에서 가장 많을 것으로 보임.
- RCP6.0 시나리오에 따르면 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년)에 우리나라 강수량은 대부분 지역에서 증가하지만 북부지역을 중심으로 감소할 것으로 전망됨. 중심부지역에 위치한 충청북도의 강수량 증가율은 우리나라 평균보다 작으나 미래에 강수량으로 인한 영향이 커질 것으로 예상됨.
 - 충청북도의 강수량은 기온분포와 유사하게 단양군에서 많고 청주시에서 적음. 현재 강수량이 많은 지역의 강수량이 미래에도 많고, 현재 강수량이 적은 지역의 강수량이 미래에도 적게 나타남.
 - 21세기 후반기에는 영동군이 충청북도 내에서 가장 큰 강수량 증가율을 나타냄.
 - 강수강도와 호우일수는 현재 지역적 차이가 크며, 미래에 강수강도의 증가율은 영동군이 가장 크고 호우일수의 증가율도 영동군이 가장 클 것으로 전망됨.
 - 강수량이 증가하는 것과 같이 21세기 후반기(2071~2100년) 5일최다강수량 또한 증가하지만 최대무강수지속기간은 오히려 길어질 것으로 전망됨.

- RCP6.0 시나리오에 따르면 응용기후정보의 경우 기온상승으로 인해 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 충청북도의 생육도일, 유효적산온도, 열지수, 불쾌지수, 냉방도일이 증가하고, 난방도일은 감소할 것으로 전망됨.
 - 냉방도일은 특히 7월과 8월에 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 10월에도 냉방이 필요해질 것으로 전망됨.
 - 21세기 전반기(2021~2040년), 중반기(2041~2070년), 후반기(2071~2100년) 전 기간에 걸쳐 충청북도의 열지수는 ‘보통’ 범위에 속하고 불쾌지수는 21세기 전반기(2021~2040년)에 ‘높음’ 범위에, 21세기 중반기(2041~2070년)와 후반기(2071~2100년)에는 ‘매우 높음’ 범위에 속할 것으로 전망됨.
 - 21세기 전반기(2021~2040년)와 중반기(2041~2070년) 충청북도의 기후는 감자의 재배에 적합하나, 21세기 후반기(2071~2100년)에는 더 이상 감자 재배에 적합하지 않을 것으로 전망됨.
- RCP2.6 시나리오에 따르면 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 충청북도의 기온상승폭은 $+1.3^{\circ}\text{C}$ 로 RCP6.0 시나리오의 $+2.2^{\circ}\text{C}$ 에 비해 0.9°C 감소하며, 강수량은 4.4% 증가에서 1.2% 감소로 전환될 것으로 전망됨.
 - 온실가스 감축으로 인한 효과는 폭염과 열대야와 같은 극한기후에서 더욱 두드러져, 현재 대비 21세기 후반기(2071~2100년) 폭염일수 증가폭은 17.5일에서 4.9일로 줄어들며, 열대야일수의 증가폭도 8.0일에서 2.8일로 줄어들 전망임.
 - 충청북도 내에서 시군별 강수강도, 호우일수, 5일최다강수량과 최대무강수지속기간의 변화율은 변동성이 큼.
 - 온실가스 감축은 생육도일과 유효적산온도에도 영향을 미쳐 충청북도의 21세기 전반기(2021~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청북도에서 10°C 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭이 모두 18% 감소할 것으로 전망됨. 또한 열지수는 13%, 불쾌지수는 4%, 냉방도일은 114% 각각 증가폭이 감소할 것으로 전망됨. 난방도일의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 온실가스 감축으로 인해 감소폭이 충청북도에서 12% 줄어들 전망임.
- 기존의 RCP4.5/RCP8.5 시나리오에 의한 전망과 본 보고서의 RCP2.6/RCP6.0 시나리오에 의한 전망을 종합해보면 네 시나리오 중 온실가스 감축 정도가 가장 큰 RCP2.6 시나리오에서 충청북도의 온난화 추세가 뚜렷이 줄어드는 것을 확인할 수 있었음.
 - 충청북도의 기온은 RCP2.6을 제외한 세 시나리오(4.5/6.0/8.5) 모두에서 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 뚜렷하게 상승하는 것으로 나타남.
 - 강수량의 경우는 변동성이 커서 뚜렷한 변화경향은 없으나 온실가스 배출량이 상대적으로 많은 RCP6.0과 RCP8.5에서 현재 대비 21세기 중반기(2041~2070년)에 소폭 감소하다가 후반기(2071~2100년)에 증가하는 경향을 보임.

그림 5-1
충청북도의 시군별
기후변화 전망 요약
(RCP6.0, 2071~2100년)



	평균 기온 (°C)	최고 기온 (°C)	최저 기온 (°C)	강수량 (%)	폭염 일수 (일)	열대야 일수 (일)	한파 일수 (일)	강수 강도 (mm/일)	호우 일수 (일)	5일 최다 강수량 (mm)	최대 무강수 지속 기간 (일)
충청북도	+1.3	+1.4	+1.2	-1.2	+4.9	+2.8	-9.1	+0.2	+0.6	+1.2	+4.0
제천시	+1.3	+1.3	+1.3	+0.2	+3.1	+1.6	-11.5	+0.4	+1.0	-1.5	+5.0
청주시	+1.3	+1.3	+1.3	-3.2	+7.4	+5.7	-6.8	+0.0	+0.2	-3.2	+1.9
충주시	+1.3	+1.3	+1.3	-0.1	+5.8	+2.9	-10.2	+0.3	+0.7	-4.1	+0.7
괴산군	+1.4	+1.3	+1.3	-1.7	+3.6	+1.8	-11.9	-0.2	+0.6	-3.9	+3.5
단양군	+1.4	+1.4	+1.4	-0.6	+2.3	+1.1	-10.2	+0.2	+1.3	+2.3	+5.5
보은군	+1.3	+1.3	+1.3	-1.5	+3.4	+2.6	-9.6	+0.1	+0.2	+6.6	+3.8
영동군	+1.4	+1.4	+1.2	+0.6	+4.8	+1.9	-5.5	+0.5	+1.1	+23.2	+6.9
옥천군	+1.3	+1.3	+1.2	-2.5	+5.7	+4.4	-6.4	+0.2	+0.2	+1.7	+6.0
음성군	+1.3	+1.4	+1.2	-1.7	+7.1	+3.1	-9.2	+0.2	+0.3	-3.2	+4.6
증평군	+1.3	+1.4	+1.2	-2.5	+7.3	+3.7	-8.7	+0.0	+0.5	-10.5	+4.4
진천군	+1.3	+1.4	+1.2	-3.6	+7.2	+3.0	-8.1	+0.2	+0.0	-4.1	+3.6

표 5-1
충청북도의 기후요소별
현재 기후값 대비 21세기
후반기(2071~2100년) 편차
(RCP2.6)

	평균 기온 (°C)	최고 기온 (°C)	최저 기온 (°C)	강수량 (%)	폭염 일수 (일)	열대야 일수 (일)	한파 일수 (일)	강수 강도 (mm/일)	호우 일수 (일)	5일 최다 강수량 (mm)	최대 무강수 지속 기간 (일)
충청북도	+2.2	+2.3	+2.2	+4.4	+17.5	+8.0	-11.5	+0.6	+0.8	+8.9	4.5
제천시	+2.2	+2.3	+2.2	+2.9	+13.9	+5.4	-14.0	+0.4	+0.8	+2.3	+6.5
청주시	+2.2	+2.2	+2.2	+4.7	+21.9	+13.5	-8.6	+0.5	+0.2	+2.2	+2.8
충주시	+2.2	+2.2	+2.2	+2.5	+19.9	+9.1	-13.1	+0.4	+0.5	+0.3	+2.6
괴산군	+2.3	+2.2	+2.2	+3.7	+16.4	+5.8	-14.9	+0.1	+0.6	-2.1	+5.0
단양군	+2.3	+2.3	+2.3	+5.2	+11.6	+3.8	-12.7	+0.6	+1.8	+21.6	+5.7
보은군	+2.2	+2.2	+2.2	+5.9	+15.5	+7.3	-11.6	+0.9	+0.5	+13.9	+3.1
영동군	+2.2	+2.2	+2.2	+8.1	+15.5	+6.1	-7.1	+1.7	+2.0	+31.8	+4.6
옥천군	+2.2	+2.1	+2.2	+6.2	+18.4	+11.6	-7.8	+1.4	+0.6	+13.5	+4.1
음성군	+2.2	+2.3	+2.2	+2.3	+22.4	+9.4	-12.5	+0.3	+0.7	+7.9	+6.2
증평군	+2.3	+2.3	+2.1	+3.4	+21.9	+10.2	-11.8	+0.2	+0.5	-7.1	+6.3
진천군	+2.3	+2.3	+2.2	+1.6	+22.1	+8.9	-11.0	+0.1	+0.1	+2.6	+5.2

표 5-2
충청북도의 기후요소별
현재 기후값 대비 21세기
후반기(2071~2100년) 편차
(RCP6.0)

표 5-3
충청북도의 시나리오별
(RCP2.6/RCP4.5/RCP6.0/RCP8.5)
기후요소 전망

	RCP 시나리오	현재 (2001~2010)	전반기 (2021~2040)	중반기 (2041~2070)	후반기 (2071~2100)
평균기온 (°C)	2.6	10.9	11.9	12.2	12.2
	4.5		11.6	12.4	13.0
	6.0		11.1	11.8	13.1
	8.5		11.6	12.9	14.8
최고기온 (°C)	2.6	17.2	18.2	18.6	18.6
	4.5		18.2	18.8	19.4
	6.0		17.5	18.2	19.5
	8.5		18.1	19.4	21.4
최저기온 (°C)	2.6	5.4	6.4	6.7	6.6
	4.5		5.9	6.9	7.3
	6.0		5.6	6.2	7.6
	8.5		5.9	7.3	9.1
강수량 (mm)	2.6	1351.3	1361.0	1319.3	1334.7
	4.5		1169.9	1400.2	1297.5
	6.0		1354.0	1342.0	1410.6
	8.5		1283.5	1292.3	1391.8
폭염일수 (일)	2.6	8.9	9.7	15.1	13.8
	4.5		13.5	13.4	22.1
	6.0		8.9	16.0	26.4
	8.5		11.0	27.4	51.5
열대야일수 (일)	2.6	0.3	1.7	4.3	3.1
	4.5		1.7	3.7	6.0
	6.0		1.1	3.6	8.3
	8.5		1.3	9.5	27.2
한파일수 (일)	2.6	17.2	8.4	8.8	8.1
	4.5		10.0	5.6	5.5
	6.0		14.5	10.4	5.7
	8.5		12.5	6.9	1.7
강수강도 (mm/일)	2.6	15.3	16.2	15.5	15.5
	4.5		14.6	16.4	15.5
	6.0		15.6	15.3	15.9
	8.5		15.7	15.1	16.1
호우일수 (일)	2.6	1.8	2.5	2.0	2.4
	4.5		1.9	2.8	3.3
	6.0		2.1	2.4	2.6
	8.5		2.4	2.1	2.4
5일최대강수량 (mm)	2.6	227.6	219.0	216.0	230.4
	4.5		199.4	243.7	252.2
	6.0		209.7	226.4	247.8
	8.5		242.5	211.2	232.7
최대무강수 지속기간 (일)	2.6	26.7	25.9	32.0	30.7
	4.5		31.4	32.7	37.6
	6.0		25.9	32.0	31.2
	8.5		29.8	30.8	31.8

**신기후체제 대비
충청북도 기후변화 전망 보고서**

◆ 발행일 2017년 12월 8일

◆ 발행처 기상청

◆ 주소 07062 서울특별시 동작구 여의대방로 16길 61

◆ 누리집 www.climate.go.kr



기상청

Korea Meteorological
Administration