

세종특별자치시 기후변화 상세 분석보고서

발간번호 11-1360000-000901-01

서울·인천·경기도

강원도

충청북도

대전·충청남도

대구·경상북도

부산·울산·경상남도

전라북도

광주·전라남도

제주도

세종특별자치시

발간사

최근들어 지구촌 곳곳이 집중호우, 태풍, 가뭄, 폭설, 홍수 등의 이상기후 현상 때문에 몸살을 앓고 있으며 이에 따른 자연재해의 규모와 피해도 꾸준히 증가하는 추세입니다. 기후변화에 의한 영향은 기후변화 자체의 강도뿐만 아니라 지역적으로 기후변화에 노출되는 정도나 취약성 정도 등의 사회경제적 여건에 따라 그 피해규모가 달라지기 때문에 지역별로 적절한 기후변화 영향·취약성을 평가하고 대응하는 것이 필요합니다. 따라서 우리나라에서는 국가 기후변화 적응대책과 더불어 기초지자체 단위의 적응대책 세부이행계획의 수립이 의무화되었습니다.

기초지자체에서 일관된 기후변화 적응대책이 수립되기 위해서는 우선 읍면동까지 상세화된 국가표준의 미래 기후변화 전망정보 제공이 필요합니다. 이에, 기상청은 각 지자체별로 미래 기후변화 경향을 한눈에 살펴보고, 이를 정책수립에 활용할 수 있도록 상세하게 분석된 기후변화 전망정보를 담은 「지역별 기후변화 상세 분석보고서」를 발간하게 되었습니다. 「세종특별자치시 기후변화 상세 분석보고서」는 새로운 기후변화 시나리오를 기반으로 하여 읍면동 단위로 분석된 2100년까지의 기온, 강수량, 극한기후현상에 대한 미래 전망 내용을 담고 있습니다. 또한 농업, 보건, 에너지 분야의 활용증대를 위해 광역시도 단위로 분석된 부문별 기후변화 응용정보를 수록하였습니다.

지역별 상세 미래 예측정보가 지역의 기후변화 현황 및 전망에 대한 이해를 높이고 기후변화에 따른 영향 및 취약성 평가를 수행하는데 활용되기를 바랍니다. 나아가 기후변화 적응 분야 및 기초지자체의 과학적이고 효율적인 기후변화 적응대책 수립에 기여하기를 기대해 봅니다.

2013.11
기상청장

06	제 1 장 서론	17	제 3 장 기후변화 전망
06	1. 지리적 특성	17	1. 평균기온
08	2. 관측 자료 소개	20	2. 강수량
09	3. 고해상도 시나리오 자료 소개	26	3. 극한기후지수
10	4. 극한기후지수 정의	26	1) 극한기온지수
11	5. 응용정보 정의	38	2) 극한강수지수
12	제 2 장 최근 10년 기후특성	42	제 4 장 분야별 응용정보
12	1. 기온	42	1. 농업(생육도일, 유효적산온도)
14	2. 강수량	46	2. 보건(열지수, 블래지수)
16	3. 기타 요소	50	3. 에너지(냉방도일, 난방도일)
		54	제 5 장 결론

표목차

- 7 표 1-1. 세종특별자치시 인구 현황(2012년)
- 9 표 1-2. RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO₂ 농도
- 10 표 1-3. 기온 및 강수 관련 극한지수의 정의
- 11 표 1-4. 농업, 보건, 에너지 분야 응용정보
- 13 표 2-1. 세종특별자치시의 일평균·최고·최저기온 및 극한지수(2001~2010년)
- 15 표 2-2. 세종특별자치시의 계절 및 연강수량과 극한지수(2001~2010년)
- 16 표 2-3. 세종특별자치시의 기온 관련 극한지수(2001~2010년)
- 19 표 3-1. 세종특별자치시의 평균기온 전망 및 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP8.5)
- 19 표 3-2. 세종특별자치시의 평균기온 전망 및 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP4.5)
- 24 표 3-3. 세종특별자치시의 연강수량 전망(mm)과 현재 기후값 대비 증가율(%)(RCP8.5)
- 25 표 3-4. 세종특별자치시의 연강수량 전망(mm)과 현재 기후값 대비 증가율(%)(RCP4.5)
- 27 표 3-5. 세종특별자치시의 폭염일수와 열대야일수(일) 전망(RCP8.5)
- 27 표 3-6. 세종특별자치시의 폭염일수와 열대야일수(일) 전망(RCP4.5)
- 31 표 3-7. 세종특별자치시의 서리일수와 결빙일수(일) 전망(RCP8.5)
- 31 표 3-8. 세종특별자치시의 서리일수와 결빙일수(일) 전망(RCP4.5)
- 35 표 3-9. 세종특별자치시의 식물성장가능기간과 여름일수(일) 전망(RCP8.5)
- 35 표 3-10. 세종특별자치시의 식물성장가능기간과 여름일수(일) 전망(RCP4.5)
- 38 표 3-11. 세종특별자치시의 강수강도·호우일수 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%)(RCP8.5)
- 39 표 3-12. 세종특별자치시의 강수강도·호우일수 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%)(RCP4.5)
- 43 표 4-1. 작물별 유효적산온도 및 생육도일
- 44 표 4-2. 우리나라 광역시도별 생육도일(도일)과 유효적산온도(°C) 전망(RCP8.5)
- 45 표 4-3. 우리나라 광역시도별 생육도일(도일)과 유효적산온도(°C) 전망(RCP4.5)
- 46 표 4-4. 열지수 기준범위
- 47 표 4-5. 불쾌지수 기준범위
- 48 표 4-6. 우리나라 광역시도별 열지수와 불쾌지수 전망(RCP8.5)
- 49 표 4-7. 우리나라 광역시도별 열지수와 불쾌지수 전망(RCP4.5)
- 52 표 4-8. 우리나라 광역시도별 냉방도일과 난방도일(도일) 전망(RCP8.5)
- 53 표 4-9. 우리나라 광역시도별 냉방도일과 난방도일(도일) 전망(RCP4.5)
- 56 표 5-1. 세종특별자치시의 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 변화량(RCP8.5)
- 56 표 5-2. 세종특별자치시의 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 변화량(RCP4.5)

그림목차

- 6 그림 1-1. 세종특별자치시의 행정구역 구분과 관측 지점의 위치
- 13 그림 2-1. 세종특별자치시의 읍면동별 연평균기온 상세분포도(2001~2010년)
- 15 그림 2-2. 세종특별자치시의 읍면동별 연강수량 상세분포도(2001~2010년)
- 17 그림 3-1. 충청남도, 충청북도와 세종특별자치시의 평균기온 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 17 그림 3-2. 평균기온 증가율이 가장 큰 지역(전의면)과 작은 지역(조치원읍)의 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 18 그림 3-3. 세종특별자치시의 읍면동별 평균기온 분포도(RCP4.5(좌)/8.5(우), 2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 21 그림 3-4. 충청남도, 충청북도와 세종특별자치시의 연강수량 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 21 그림 3-5. 연강수량 증가율이 가장 큰 지역(소정면)과 작은 지역(조치원읍)의 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 22 그림 3-6. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 연강수량 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 23 그림 3-7. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 강수량 증가율(2001~2010년 대비) 분포도(2011~2040년(상),
2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 28 그림 3-8. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 폭염일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 29 그림 3-9. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 열대야일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 32 그림 3-10. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 서리일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 33 그림 3-11. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 결빙일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 36 그림 3-12. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 식물성장가능기간 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
2071~2100년(하))
- 37 그림 3-13. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 여름일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 40 그림 3-14. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 강수강도 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 41 그림 3-15. 세종특별자치시의 읍면동별 RCP4.5(좌)/8.5(우) 호우일수 분포도(2011~2040년(상), 2041~2070년(중), 2071~2100년(하))
- 51 그림 4-1. 세종특별자치시의 월별 냉방도일 전망(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 51 그림 4-2. 세종특별자치시의 월별 난방도일 전망(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))
- 55 그림 5-1. 세종특별자치시의 읍면동별 기후변화 전망 요약

제1장 서론

'세종특별자치시 기후변화 상세 분석보고서'는 저탄소 녹색성장 기본법 시행령(2012년 12월 27일 개정)에 따라 2015년부터 의무화된 기초지자체의 '기후변화 적응대책 세부시행계획' 수립을 지원하기 위해 작성한 보고서임.

그림 1-1.
세종특별자치시의 행정구역 구분과 관측 지점의 위치



★) 한솔동 내에 14개(반곡동, 소담동, 보람동, 대평동, 가람동, 한솔동, 나성동, 새롬동, 다정동, 어진동, 중촌동, 고운동, 아름동, 도담동)의 법정동이 존재함

1. 지리적 특성

- 충청남도 동부와 충청북도의 서부사이에 위치한 세종특별자치시는 동쪽으로 충청북도 청원군, 서쪽으로 충청남도 공주시, 남쪽으로는 대전광역시, 북쪽은 천안시에 접하고 있음.

- 세종특별자치시는 2012년 7월 1일 세종특별자치시가 출범한 이후, 현재 1읍 9면 1동*)의 행정체계를 갖추게 되었음(그림 1-1). 2012년 현재 총인구는 113,117명이며, 총면적은 464.88km²으로 충청북도(7,433km²) 총면적의 6.3%에 해당함. 세종특별자치시 내 가장 넓은 면적을 차지하는 곳은 금남면(78.14km²)이며, 가장 좁은 곳은 한솔동(1.15km²)임.
- 2012년 12월말 세종특별자치시의 사업체수는 총 6,625개, 종사자수는 45,666명으로, 충청북도 사업체수의 약 6.06%, 종사자수의 약 8.27%에 해당됨. 세종특별자치시 종사자수의 약 35%가 제조업에서 종사하고 있음.

표 1-1.
세종특별자치시 인구 현황(2012년)

연도	세대수(가구)	인구(명)			2011년 대비 증가율 (%)
		계	남	여	
2012년	46,592	113,117	57,633	55,484	-

- 세종특별자치시는 우리나라 중부에 위치하며, 남북으로 길쭉하게 펼쳐져 있어 금강에서 전의 산악지대까지 지형이 고루 형성되어 있음. 세종특별자치시에는 산이 많으며 그중 운주산(459m)과 국사봉(402.7m), 금병산(364m), 작성산(331.5m)이 대표적임. 대부분의 산이 고도가 낮기 때문에 목야지 또는 과수원으로 활용하기에 적합함. 세종특별자치시의 주요 하천은 금강과 미호천이 있으며, 지질은 선캄브리아기에 해당되는 각종 변성암류와 이를 매입한 중생대 쥬라기의 대보화강암 및 이들을 부정합으로 피복한 신생대 제4기 충적층으로 구성되어 있음.
- 세종특별자치시는 연평균기온이 12.0℃(최고 18.1℃, 최저 6.9℃)이고, 1월 평균기온은 -2.5℃(최고 3.1℃, 최저 -7.4℃), 8월의 평균기온은 25.1℃(최고 30.1℃, 최저 21.3℃)임. 연간 강수량은 1,254.6mm이며 강수량 많은 달과 적은 달의 차이가 큼(1월 24.5mm, 8월 290.4mm).*)

★) 2001~2010년 세종특별자치시
기후값 기준

2. 관측 자료 소개

- 한반도의 고해상도 격자형 관측 자료를 산출하기 위해 75개소의 종관 관측자료(Automated Synoptic Observing System, ASOS)와 462개소의 자동기상 관측자료(Automatic Weather System, AWS)를 합한 총 537개소의 관측 자료를 사용하였음. 세종특별자치시에는 4개의 자동기상관측지점이 위치함(그림 1-1).
- 분석기간은 2001년부터 2010년까지 10년이며, 변수는 일별기온(최고/평균/최저)과 일 강수량이 사용되었음. 관측 자료는 해발고도가 높은 일부산악지역을 제외하면 대부분의 지역에서 골고루 분포하고 있음. 관측 지점수와 관측 자료의 품질을 고려했을 때 2000년 이후의 자료를 사용하는 것이 신뢰할 수 있는 상세 공간해상도를 확보할 수 있다고 판단됨.
- 관측 자료를 거리, 고도, 지향면, 해양도를 고려하여 1km 해상도의 격자자료로 내삽한 뒤 각 읍면동에 해당하는 격자를 평균하여 행정구역별 자료를 생산하였음. 고해상도 격자형 관측 자료 산출방법은 **MK-PRISM**(Modified-Korean Parameter-elevation Regressions on Independent Slopes Model)*을 적용하였음.
- 본 보고서에서 현재 기후값의 기준은 2001~2010년의 10년 평균을 사용함.
- 본 보고서에서 비교를 위해 사용한 충청남도과 충청북도 자료는 세종특별자치시가 생기기 이전(2013년 1월 기준)의 행정구역을 기준으로 한 것으로 세종특별자치시 값을 포함하고 있음.

*) 참고문헌
김맹기 등(2012). 1km 해상도의 관측 격자자료 생산 기술, 기후연구, 제7권 제1호, 55~68pp.

3. 고해상도 시나리오 자료 소개

- 기후변화 시나리오는 기후변화에 관한 정부간협의체(IPCC)에서 5차 평가보고서용으로 발표한 온실가스 배출 시나리오인 RCP(Representative Concentration Pathways) 시나리오를 기초로 하였음. 온실가스 배출 시나리오는 표 1-2와 같이 기본 4종이 있으나 본 보고서에서는 온실가스 배출을 현재 추세대로 유지하였을 경우(RCP8.5)와 적극적인 저감 정책을 수행하였을 경우(RCP4.5)를 기준으로 분석함.

종류	시나리오 설명	2100년 기준 CO ₂ 농도(ppm)
RCP2.6	지금부터 즉시 온실가스 감축 정책을 시행할 경우	420
RCP4.5	온실가스 저감 정책이 상당히 실현되는 경우	540
RCP6.0	온실가스 저감 정책이 어느 정도 실현되는 경우	670
RCP8.5	현재 추세(저감없이)로 온실가스가 배출되는 경우(BAU 시나리오)	940

표 1-2. RCP 시나리오별 설명 및 2100년 기준 CO₂ 농도

- 우선 약 135km 해상도의 전지구 기후변화 시나리오를 산출하고, 지역기후모델을 이용하여 한반도에 대한 12.5km 해상도의 지역 기후변화 시나리오를 산출함. 전지구 기후변화 시나리오는 영국기상청의 HadGEM2-AO 모델을 사용하였으며, 한반도 기후변화 시나리오는 영국기상청 지역기후모델인 HadGEM3-RA를 사용함.
- 기후변화 시나리오를 이용하여 미래 전망을 분석할 경우 현재(2001~2010년)를 기준으로 10년 단위로 분석하거나 21세기 전반기(2011~2040년), 21세기 중반기(2041~2070년), 21세기 후반기(2071~2100년)의 30년 단위로 분석을 수행함.

고해상도(1km) 남한상세 기후변화 시나리오를 생산하기 위하여 다음과 같은 과정을 거침.

- 1) 앞서 생산한 1km 해상도의 관측 격자자료를 2001~2010년 기간에 대해 평균하여 관측 기후값을 만들.
- 2) 12.5km 한반도 지역 기후변화 시나리오 자료를 1km로 객관분석한 후 각 격자점별로 계절 변동(Seasonal cycle)을 제거한 편차(Anomaly)를 추출함.
- 3) 1)의 관측 기후값과 2)의 미래 기후변화 전망 편차를 더하여 1km 해상도의 상세 기후변화 시나리오를 생산함. 이러한 통계적 상세화 방법을 PRIDE 모델이라고 함.

(PRIDE : PRISM based Downscaling Estimation)

4. 극한기후지수 정의

● 본 보고서에서는 기온과 강수량 이외에 6개 기온 관련 극한기후지수(열대야일수, 폭염일수, 서리일수, 결빙일수, 여름일수, 식물성장가능기간)와 2개 강수 관련 기후지수(강수강도, 호우일수)를 분석하였으며, 각 지수의 정의는 표 1-3과 같음. 극한기후지수는 우선 격자별로 생산한 뒤 이를 행정구역별로 평균하였음.

● 강수강도와 호우일수의 경우는 지역기후모델의 한계로 극값이 관측보다 작게 나오므로 다음과 같이 각 격자별로 보정하여 분석하였음.

- 보정된 극한기후지수 = 보정상수 × 극한기후지수

$$\text{보정상수} = \frac{\text{관측 격자자료의 극한지수 기후값(2000~2010년)}}{(\text{관측 격자자료 기후값} + 12.5\text{km 지역기후모델 편차}) \times \text{극한지수 기후값(2000~2010년)}}$$

표 1-3. 기온 및 강수 관련 극한지수의 정의

요소	극한지수	정의	단위
기온	서리일수 (Frost days)	일최저기온이 0℃ 미만인 날의 연중 일수	일
	여름일수 (Summer days)	일최고기온이 25℃ 이상인 날의 연중 일수	일
	결빙일수 (Ice days)	일최고기온이 0℃ 미만인 날의 연중 일수	일
	열대야일수 (Tropical night days)	일최저기온이 25℃ 이상인 날의 연중 일수	일
	폭염일수 (Heat wave days)	일최고기온이 33℃ 이상인 날의 연중 일수	일
	식물성장가능기간 (Growing season length)	일평균기온이 5℃ 보다 높은 날이 6일 이상 지속된 첫 날부터 일평균기온이 5℃ 미만인 날이 6일 이상 지속된 첫 날까지 사이의 연중 일수	일
강수	호우일수 (Heavy rain days)	일강수량이 80mm 이상인 날의 연중 일수	일
	강수강도 (Simple daily intensity index)	연중 습윤일수(일강수량이 1.0mm 이상인 날)로 나누어진 연 총강수량	mm/일

5. 응용정보 정의

- 본 보고서에서는 농업분야 2개, 보건분야 2개, 에너지분야 2개의 응용정보를 사용하였고, 각 지수의 정의는 표 1-4와 같음.

분야	응용정보	정의	산출방법	단위
농업	유효적산온도	작물의 생육에 필요한 열량을 나타내기 위한 것으로 일평균기온에서 생육한계온도(5, 10℃)를 뺀 값을 적산한 값	$EAT = \Sigma(Ta - Tb)$ * Ta : 일평균기온, Tb (생육한계온도) = 5℃, 10℃	℃
	생육도일	일최고기온과 일최저기온의 평균에서 작물별 기본온도를 뺀 것을 생육기간동안 합한 값	$GDD = \Sigma \{ (Tmax + Tmin) / 2 - Tb \}$ * Tb (기본온도) = 5℃, 10℃	도일
보건	열지수	일사병이나 열 경련의 위험도를 나타내는 지수로 경고(27~32), 주의(32~41), 위험(41~54), 매우 위험(54 이상)으로 분류됨.	$HI = -42.379 + 2.04901523 \times Tf + 10.14333127 \times RH - 0.22475541 \times Tf \times RH - 6.83783 \times 10^{-3} \times Tf^2 - 5.481717 \times 10^{-2} \times RH^2 + 1.22874 \times 10^{-3} \times Tf^2 \times RH + 8.5282 \times 10^{-4} \times Tf \times RH^2 - 1.99 \times 10^{-6} \times Tf^2 \times RH^2$ * Tf : 최고기온, RH : 상대습도	
	불쾌지수	체감기후를 나타내는 온습도지수로 낮음(68 미만), 보통(68~75), 높음(75~80), 매우 높음(80이상)으로 분류됨.	$DI = 9/5 \times Ta - 0.55 \times (1 - RH) (9/5 \times Ta - 26) + 32$ * Ta : 최고기온, RH : 상대습도	
에너지	냉방도일	냉방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 일평균기온에서 기준온도(24℃)를 뺀 값을 적산한 값	$CDD = \Sigma(\text{일평균기온} - 24)$	도일
	난방도일	난방에 필요한 열량을 규정하는 기후정보로 기준온도(18℃)에서 일평균기온을 뺀 값을 적산한 값	$HDD = \Sigma(18 - \text{일평균기온})$	도일

표 1-4. 농업, 보건, 에너지 분야 응용정보

제2장

최근 10년 기후특성

1. 기온

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 기후값

- 충청남도 동부와 충청북도 서부 사이에 위치한 세종특별자치시의 연평균기온은 12.0℃로 충청남도 연평균기온(12.0℃)과 같고, 충청북도 연평균기온(10.9℃)보다 높음.
- 세종특별자치시에서 연평균기온이 가장 높은 지역은 한솔동(12.5℃)이고, 가장 낮은 지역은 전의면(11.3℃)이며, 그 차이는 1.2℃에 달함.
- 세종특별자치시의 연평균 최고기온은 18.1℃, 연평균 최저기온은 6.9℃으로 나타났고, 연평균 일교차는 11.2℃임.

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 극한값

- 세종특별자치시의 열대야일수와 폭염일수는 각각 0.9일, 10.6일로 충청남도 평균(1.8일, 7.9일)보다 열대야일수는 적고, 폭염일수는 많으며, 충청북도 평균(0.3일, 8.9일)과 비교하여 열대야일수와 폭염일수가 모두 많음.
- 폭염일수는 부강면에서 13.2일로 가장 많이 발생하고, 연서면에서 7.0일로 가장 적게 발생함.
- 열대야일수는 한솔동과 부강면(1.4일)에서 많이 발생하고 연서면(0.4일)에서 가장 적게 발생함.




그림 2-1.
세종특별자치시의 읍면동별 연평균기온
상세분포도(2001~2010년)

	기온(°C)			열대야일수 (일)	폭염일수 (일)
	일평균	일최고	일최저		
충청남도	12.0	17.6	7.2	1.8	7.9
충청북도	10.9	17.2	5.4	0.3	8.9
세종특별자치시	12.0	18.1	6.9	0.9	10.6
조치원읍	12.0	18.2	6.8	0.5	7.7
금남면	12.4	18.3	7.4	1.2	12.1
부강면	12.4	18.4	7.4	1.4	13.2
소정면	11.6	17.8	6.2	0.8	10.1
연기면	12.4	18.5	7.2	1.2	11.6
연동면	12.4	18.5	7.3	1.1	12.1
연서면	11.9	18.0	6.7	0.4	7.0
장군면	12.2	18.2	7.2	1.0	10.9
전동면	11.5	17.6	6.2	0.5	9.0
전의면	11.3	17.4	6.0	0.7	9.1
한솔동	12.5	18.5	7.3	1.4	12.8

표 2-1.
세종특별자치시의
일평균 · 최고 · 최저기온 및
극한지수(2001~2010년)

2. 강수량

● 최근 10년(2001~2010년) 강수량 기후값

- 세종특별자치시의 연강수량은 1,236.2mm로 충청남도 평균(1,264.2mm)과 충청북도 평균(1,351.4mm)보다 적음.
- 세종특별자치시 내에서는 소정면이 연강수량 1,294.5mm로 가장 많고, 금남면은 1,149.6mm로 가장 적어서 그 차이가 144.9mm로 나타남.

● 최근 10년(2001~2010년) 강수 극한값

- 세종특별자치시의 강수강도는 15.1mm/일로 충청남도 평균(15.1mm/일) 및 충청북도 평균(15.2mm/일)과 비슷하고, 호우일수는 1.6일로 충청남도 평균(1.7일)과 충청북도 평균(1.8일)보다 약간 적게 나타남.
- 호우일수는 연서면에서 1.8일로 가장 빈번하게 발생하고, 금남면에서 1.1일로 가장 적게 나타남.
- 강수강도는 연서면, 전의면, 소정면에서 15.4mm/일로 가장 강하고, 금남면에서 14.3mm/일로 가장 약하여, 그 차이가 1.1mm/일 정도 나타남.




그림 2-2.
세종특별자치시의 읍면동별 연강수량
상세분포도(2001~2010년)

	강수량(mm)					강수강도 (mm/일)	호우일수 (일)
	봄	여름	가을	겨울	연		
충청남도	221.1	734.0	225.7	100.3	1264.2	15.1	1.7
충청북도	230.1	809.5	229.0	101.5	1351.4	15.2	1.8
세종특별자치시	217.4	718.1	222.8	72.5	1236.2	15.1	1.6
조치원읍	225.1	726.4	227.4	77.2	1261.6	15.3	1.7
금남면	201.8	688.5	195.8	59.6	1149.6	14.3	1.1
부강면	216.9	733.8	214.6	77.3	1248.4	14.8	1.6
소정면	224.6	736.1	251.0	75.9	1294.5	15.4	1.6
연기면	218.5	715.9	216.3	74.4	1230.6	14.9	1.6
연동면	219.1	719.7	217.5	77.3	1239.5	14.9	1.6
연서면	226.3	731.5	228.1	77.8	1269.0	15.4	1.8
장군면	213.7	710.3	213.8	69.1	1212.0	14.8	1.3
전동면	221.6	725.5	242.4	76.0	1271.9	15.2	1.6
전의면	224.7	734.0	249.8	77.5	1292.3	15.4	1.7
한솔동	212.9	705.4	210.8	68.3	1202.3	14.7	1.4

표 2-2.
세종특별자치시의 계절 및 연강수량과
극한지수(2001~2010년)

3. 기타 요소

● 최근 10년(2001~2010년) 기온 관련 현상일수

- 세종특별자치시는 연평균 최저기온은 충청남도보다 낮고 충청북도보다 높기 때문에 서리일수가 119.2일로 충청남도보다 4.7일 많고, 충청북도보다 14.6일 적음. 세종특별자치시의 연평균 최고기온은 충청남도와 충청북도보다 높아 결빙일수는 14.2일로 충청남도와 충청북도 평균보다 각각 0.5일, 6.2일 적음. 여름일수는 123.5일로 충청남도와 충청북도 평균보다 각각 9.0일, 13.1일 많으며, 식물성장가능기간이 259.1일로 충청북도 평균보다 11.1일 길게 나타남.
- 서리일수는 금남면에서, 결빙일수는 연동면에서 각각 111.8일, 10.6일로 가장 적게 나타난 반면, 식물성장가능기간은 부강면에서 262.8일로 가장 길게 나타남.
- 여름일수는 한솔동에서 가장 길고, 전의면에서 가장 짧으며 그 차이가 13.7일 정도 나타남.

표 2-3.
세종특별자치시의 기온 관련
극한지수(2001~2010년)

	서리일수(일)	결빙일수(일)	여름일수(일)	식물성장가능기간(일)
충청남도	114.5	14.7	114.5	258.1
충청북도	133.8	20.4	110.4	248.0
세종특별자치시	119.2	14.2	123.5	259.1
조치원읍	120.0	11.6	123.6	259.3
금남면	111.8	12.4	125.6	261.6
부강면	113.1	12.1	127.8	262.8
소정면	127.8	17.3	122.9	254.3
연기면	115.0	10.8	128.0	262.2
연동면	114.3	10.6	129.2	262.5
연서면	120.7	12.6	120.9	258.7
장군면	115.0	12.9	124.6	260.5
전동면	127.0	18.1	118.6	254.6
전의면	130.4	20.3	115.8	251.6
한솔동	113.5	10.8	129.5	262.3

제3장 기후변화 전망

1. 평균기온

● 2100년까지 기온 변화경향

- 온실가스를 저감하지 않는 RCP8.5 시나리오에서 세종특별자치시 연평균기온은 2000년대에 비해 2040년대에는 2.1℃, 2090년대에는 5.4℃ 상승함.
- 현재 세종특별자치시 연평균기온은 충청남도 평균과는 같고, 충청북도 평균보다 높으며 세종특별자치시의 미래 기온 상승 정도*는 충청남도보다 낮고, 충청북도와 동일함. 세종특별자치시와 충청북도의 기온 상승폭은 전국적으로 비교해 보면** 낮은 수준임.
- 세종특별자치시 내 평균기온의 변화량은 차이가 크지 않음.

*) 2071~2100년
 세종특별자치시 기온상승 : +4.7℃
 충청남도 기온상승 : +4.8℃
 충청북도 기온상승 : +4.7℃

***) 2071~2100년 기온상승 :
 (최대) 인천 : +5.1℃,
 (최소) 광주, 제주 : +4.6℃

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 수행한다면 온실가스 배출 수준을 현재 추세대로 유지하였을 때와 비교하여 기온 상승폭은 절반에 못 미침.***)

****) 2090년대 세종특별자치시 평균 기온상승 :
 (RCP8.5) 5.4℃ 상승 →
 (RCP4.5) 2.2℃ 상승

● 아열대 기후구 전망

- 세종특별자치시는 RCP8.5 시나리오에서 2070년대부터 아열대기후로 변화하고, RCP4.5 시나리오에서는 아열대기후에 속하지 않을 것으로 전망됨.

◆ 트레와다 아열대 기후구 정의

월평균기온 10℃ 이상인 달이 8개 월 이상, 가장 추운달 평균기온이 18℃ 이하인 경우




그림 3-1. 충청남도, 충청북도와 세종특별자치시의 평균기온 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))

그림 3-2. 평균기온 증가율이 가장 큰 지역(전의면)과 작은 지역(조치원읍)의 시계열(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))

그림 3-3.
 세종특별자치시의 읍면동별 평균기온
 분포도(RCP4.5(좌)/8.5(우),
 2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))




표 3-1. 세종특별자치시의 평균기온 전망 및 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP8.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	2001~2010	2011~2020	2021~2030	2031~2040	2041~2050	2051~2060	2061~2070	2071~2080	2081~2090	2091~2100
충청남도	12.0	+0.1	+1.1	+1.3	+2.1	+2.4	+3.3	+4.2	+4.7	+5.4
		+0.8			+2.6			+4.8		
충청북도	10.9	+0.1	+1.0	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.6	+5.3
		+0.8			+2.6			+4.7		
세종특별자치시	12.0	+0.2	+1.1	+1.4	+2.1	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.4
		+0.9			+2.6			+4.7		
조치원읍	12.0	+0.1	+1.0	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.0	+4.6	+5.3
금남면	12.4	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.4
부강면	12.4	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.3
소정면	11.6	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.3
연기면	12.4	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.6	+5.3
연동면	12.4	+0.1	+1.0	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.6	+5.3
연서면	11.9	+0.1	+1.0	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.0	+4.6	+5.3
장군면	12.2	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.3
전동면	11.5	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.3
전의면	11.3	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.4
한솔동	12.5	+0.1	+1.1	+1.3	+2.0	+2.4	+3.2	+4.1	+4.7	+5.3

표 3-2. 세종특별자치시의 평균기온 전망 및 현재 기후값 대비 편차(°C)(RCP4.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	2001~2010	2011~2020	2021~2030	2031~2040	2041~2050	2051~2060	2061~2070	2071~2080	2081~2090	2091~2100
충청남도	12.0	+0.3	+0.7	+0.8	+1.5	+1.5	+1.8	+2.0	+2.3	+2.3
		+0.6			+1.6			+2.2		
충청북도	10.9	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.1
		+0.6			+1.5			+2.1		
세종특별자치시	12.0	+0.4	+0.7	+0.8	+1.5	+1.4	+1.7	+2.0	+2.2	+2.2
		+0.6			+1.5			+2.1		
조치원읍	12.0	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.4	+1.6	+1.9	+2.1	+2.1
금남면	12.4	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.2
부강면	12.4	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.2
소정면	11.6	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.2
연기면	12.4	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.4	+1.6	+1.9	+2.2	+2.2
연동면	12.4	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.4	+1.6	+1.9	+2.2	+2.2
연서면	11.9	+0.3	+0.6	+0.7	+1.4	+1.4	+1.6	+1.9	+2.1	+2.1
장군면	12.2	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.2
전동면	11.5	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+2.0	+2.2	+2.2
전의면	11.3	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+2.0	+2.2	+2.2
한솔동	12.5	+0.3	+0.6	+0.8	+1.4	+1.4	+1.7	+1.9	+2.2	+2.2

2. 강수량

● 2100년까지 강수량 변화경향

- RCP8.5에서 21세기 후반기(2071~2100년) 충청남도과 충청북도의 강수량 증가율은 각각 33.8%, 23.5%이며, 세종특별자치시의 증가율은 32.6%로 충청남도보다 작게, 충청북도보다 크게 증가함. 세종특별자치시의 증가율은 증가율이 가장 큰 부산* 및 증가율이 가장 작은 대구**와 비교하였을 때 중간 수준임.
- 지역별로 살펴보면 금남면에서 강수량 증가가 가장 크게 나타났고, 전동면의 강수량 증가가 가장 작은 것으로 나타났으며, 그 차이는 10.0%임.
 - RCP8.5 21세기 후반기 기준 : 금남면 36.7% 증가, 전동면 26.7% 증가

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우(RCP4.5)와 온실가스 배출 수준을 현재 추세로 유지하였을 경우(RCP8.5)를 비교해 보면, 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 약 8% 더 증가하는 것으로 나타남.

★) 부산 강수증가율 :
 (2001~2010) 1,532.1mm →
 (2071~2100) 2,249.8mm
 (46.8% 증가)

★★) 대구 강수증가율 :
 (2001~2010) 1,224.8mm →
 (2071~2100) 1,421.3mm
 (16.0% 증가)




그림 3-4. 충청남도, 충청북도, 세종특별자치시의 연강수량 시계열 (RCP4.5(좌), RCP8.5(우))





그림 3-5. 연강수량 증가율이 가장 큰 지역(소정면)과 작은 지역(조치원읍)의 시계열 (RCP4.5(좌), RCP8.5(우))

그림 3-6.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 연강수량 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))






그림 3-7.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP 4.5(좌)/8.5(우) 강수량
 증가율(2001~2010년 대비) 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))

표 3-3. 세종특별자치시의 연강수량 전망(mm)과 현재 기후값 대비 증가율(%) (RCP8.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	2001~ 2010	2011~ 2020	2021~ 2030	2031~ 2040	2041~ 2050	2051~ 2060	2061~ 2070	2071~ 2080	2081~ 2090	2091~ 2100
충청남도	1264.2	1570.2	1538.4	1469.6	1646.3	1779.0	1685.8	1730.6	1677.2	1665.6
		+24.2%	+21.7%	+16.2%	+30.2%	+40.7%	+33.3%	+36.9%	+32.7%	+31.8%
				+20.7%			+34.8%			+33.8%
충청북도	1351.4	1585.0	1563.5	1494.0	1715.1	1766.8	1738.3	1699.5	1713.6	1593.7
		+17.3%	+15.7%	+10.6%	+26.9%	+30.7%	+28.6%	+25.8%	+26.8%	+17.9%
				+14.5%			+28.8%			+23.5%
세종특별자치시	1236.2	1534.6	1541.2	1432.6	1632.0	1709.5	1711.1	1663.2	1660.7	1595.4
		+24.1%	+24.7%	+15.9%	+32.0%	+38.3%	+38.4%	+34.5%	+34.3%	+29.1%
				+21.6%			+36.2%			+32.6%
조치원읍	1285.7	1548.0	1534.6	1421.6	1639.7	1706.1	1719.4	1649.2	1682.5	1590.8
		+20.4%	+19.4%	+10.6%	+27.5%	+32.7%	+33.7%	+28.3%	+30.9%	+23.7%
				+16.8%			+31.3%			+27.6%
금남면	1167.3	1507.0	1538.0	1428.6	1607.6	1654.5	1639.5	1639.2	1584.6	1564.6
		+29.1%	+31.8%	+22.4%	+37.7%	+41.7%	+40.5%	+40.4%	+35.7%	+34.0%
				+27.7%			+40.0%			+36.7%
부강면	1271.2	1556.0	1554.4	1446.6	1653.4	1699.1	1681.4	1653.8	1653.1	1543.6
		+22.4%	+22.3%	+13.8%	+30.1%	+33.7%	+32.3%	+30.1%	+30.0%	+21.4%
				+19.5%			+32.0%			+27.2%
소정면	1320.4	1583.0	1581.2	1467.1	1670.8	1798.4	1810.6	1743.8	1753.9	1678.3
		+19.9%	+19.8%	+11.1%	+26.5%	+36.2%	+37.1%	+32.1%	+32.8%	+27.1%
				+16.9%			+33.3%			+30.7%
연기면	1253.1	1529.9	1546.2	1436.0	1642.0	1705.9	1678.7	1657.5	1655.1	1609.9
		+22.1%	+23.4%	+14.6%	+31.0%	+36.1%	+34.0%	+32.3%	+32.1%	+28.5%
				+20.0%			+33.7%			+30.9%
연동면	1262.6	1549.3	1548.1	1438.6	1656.3	1709.4	1685.9	1648.9	1669.3	1591.6
		+22.7%	+22.6%	+13.9%	+31.2%	+35.4%	+33.5%	+30.6%	+32.2%	+26.1%
				+19.8%			+33.4%			+29.6%
연서면	1293.1	1530.9	1534.3	1417.5	1642.1	1734.0	1720.3	1662.2	1695.7	1613.1
		+18.4%	+18.7%	+9.6%	+27.0%	+34.1%	+33.0%	+28.5%	+31.1%	+24.7%
				+15.6%			+31.4%			+28.1%
장군면	1232.9	1514.1	1502.0	1432.9	1617.1	1679.7	1672.3	1662.0	1633.2	1574.7
		+22.8%	+21.8%	+16.2%	+31.2%	+36.2%	+35.6%	+34.8%	+32.5%	+27.7%
				+20.3%			+34.3%			+31.7%
전동면	1297.5	1539.8	1540.9	1422.9	1618.5	1713.8	1768.9	1662.0	1680.0	1588.2
		+18.7%	+18.8%	+9.7%	+24.7%	+32.1%	+36.3%	+28.1%	+29.5%	+22.4%
				+15.9%			+31.1%			+26.7%
전의면	1318.4	1547.9	1557.4	1436.3	1636.7	1774.8	1814.5	1696.5	1721.9	1638.1
		+17.4%	+18.1%	+8.9%	+24.1%	+34.6%	+37.6%	+28.7%	+30.6%	+24.2%
				+14.8%			+32.1%			+27.8%
한솔동	1223.0	1522.6	1539.2	1437.6	1627.6	1686.5	1666.0	1656.4	1623.5	1598.5
		+24.5%	+25.9%	+17.5%	+33.1%	+37.9%	+36.2%	+35.4%	+32.7%	+30.7%
				+22.6%			+35.7%			+33.0%

표 3-4. 세종특별자치시의 연강수량 전망(mm)과 현재 기후값 대비 증가율(%) (RCP4.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	2001~ 2010	2011~ 2020	2021~ 2030	2031~ 2040	2041~ 2050	2051~ 2060	2061~ 2070	2071~ 2080	2081~ 2090	2091~ 2100
충청남도	1264.2	1432.3 +13.3%	1661.9 +31.5%	1600.6 +26.6%	1534.1 +21.3%	1598.9 +26.5%	1711.6 +35.4%	1636.8 +29.5%	1919.8 +51.9%	1737.0 +37.4%
			+23.8%			+27.7%		+39.6%		
충청북도	1351.4	1497.3 +10.8%	1672.8 +23.8%	1677.7 +24.1%	1575.2 +16.6%	1585.7 +17.3%	1738.0 +28.6%	1684.5 +24.6%	1909.4 +41.3%	1761.7 +30.4%
			+19.6%			+20.8%		+32.1%		
세종특별자치시	1236.2	1403.4 +13.5%	1680.2 +35.9%	1619.2 +31.0%	1494.1 +20.9%	1529.5 +23.7%	1706.2 +38.0%	1617.1 +30.8%	1911.2 +54.6%	1671.1 +35.2%
			+26.8%			+27.5%		+40.2%		
조치원읍	1285.7	1405.5 +9.3%	1704.6 +32.6%	1627.3 +26.6%	1489.6 +15.9%	1538.3 +19.6%	1683.3 +30.9%	1604.3 +24.8%	1915.6 +49.0%	1644.9 +27.9%
			+22.8%			+22.1%		+33.9%		
금남면	1167.3	1375.0 +17.8%	1620.7 +38.8%	1542.9 +32.2%	1479.6 +26.8%	1483.3 +27.1%	1692.6 +45.0%	1559.3 +33.6%	1812.5 +55.3%	1624.5 +39.2%
			+29.6%			+32.9%		+42.7%		
부강면	1271.2	1422.2 +11.9%	1671.1 +31.5%	1628.6 +28.1%	1510.9 +18.9%	1529.4 +20.3%	1686.8 +32.7%	1606.3 +26.4%	1857.4 +46.1%	1725.7 +35.8%
			+23.8%			+24.0%		+36.1%		
소정면	1320.4	1440.4 +9.1%	1745.2 +32.2%	1696.0 +28.4%	1554.3 +17.7%	1613.6 +22.2%	1762.2 +33.5%	1711.4 +29.6%	2002.1 +51.6%	1874.3 +41.9%
			+23.2%			+24.5%		+41.1%		
연기면	1253.1	1406.6 +12.2%	1666.3 +33.0%	1582.4 +26.3%	1489.1 +18.8%	1512.3 +20.7%	1716.0 +36.9%	1588.9 +26.8%	1861.6 +48.6%	1628.9 +30.0%
			+23.8%			+25.5%		+35.1%		
연동면	1262.6	1417.1 +12.2%	1682.7 +33.3%	1604.2 +27.1%	1497.9 +18.6%	1531.1 +21.3%	1701.4 +34.8%	1584.7 +25.5%	1848.5 +46.4%	1679.4 +33.0%
			+24.2%			+24.9%		+35.0%		
연서면	1293.1	1412.6 +9.2%	1692.0 +30.8%	1635.8 +26.5%	1480.2 +14.5%	1525.0 +17.9%	1700.4 +31.5%	1625.3 +25.7%	1942.5 +50.2%	1621.2 +25.4%
			+22.2%			+21.3%		+33.8%		
장군면	1232.9	1393.8 +13.1%	1652.7 +34.0%	1588.9 +28.9%	1476.9 +19.8%	1497.6 +21.5%	1728.6 +40.2%	1594.1 +29.3%	1907.0 +54.7%	1615.3 +31.0%
			+25.3%			+27.2%		+38.3%		
전동면	1297.5	1408.2 +8.5%	1721.6 +32.7%	1674.8 +29.1%	1500.0 +15.6%	1566.9 +20.8%	1684.5 +29.8%	1651.5 +27.3%	1990.1 +53.4%	1701.0 +31.1%
			+23.2%			+22.1%		+37.3%		
전의면	1318.4	1416.6 +7.4%	1728.9 +31.1%	1704.5 +29.3%	1510.6 +14.6%	1580.4 +19.9%	1719.0 +30.4%	1706.7 +29.5%	2037.2 +54.5%	1763.0 +33.7%
			+22.6%			+21.6%		+39.2%		
한솔동	1223.0	1396.7 +14.2%	1652.7 +35.1%	1564.9 +28.0%	1488.7 +21.7%	1500.3 +22.7%	1720.9 +40.7%	1580.3 +29.2%	1850.7 +51.3%	1624.3 +32.8%
			+25.8%			+28.4%		+37.8%		

3. 극한기후지수

1) 극한기온지수

● 2100년까지 30년 단위 폭염과 열대야 변화

- 세종특별자치시는 충청남도보다 폭염일수의 발생은 많고, 열대야일수의 발생은 적으며, 충청북도보다 폭염일수와 열대야일수의 발생이 많고, 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 그 차이는 더욱 커짐.
- RCP8.5의 경우 세종특별자치시의 폭염일수가 21세기 후반기(2071~2100년)에 10.6일에서 69.6일로 6.6배 증가하고, 열대야일수는 0.9일에서 54.1일로 60.1배 증가함. 기온 상승으로 인한 폭염과 열대야 발생일수의 증가가 두드러지게 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년)에 폭염일수와 열대야일수가 가장 많이 발생하는 지역은 한솔동으로 나타남. 세종특별자치시 내 읍면동의 기온 상승폭이 서로 비슷하여 현재 발생일수가 많은 편인 지역이 21세기 후반기(2071~2100년)에도 많게 나타남.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우 기온 상승폭은 절반이하 수준으로 떨어지고 이에 따라 폭염일수와 열대야일수의 발생도 절반이하 수준으로 낮아짐.
- RCP4.5의 경우 세종특별자치시의 폭염일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 26.7일이 나타나 2.5배 증가에 그쳐, RCP8.5의 6.5배 증가의 절반 이하 수준으로 떨어지며, 열대야일수도 24.1일로 26.8배 증가에 그쳐 온실가스 감축 효과가 크게 나타남.


표 3-5. 세종특별자치시의 폭염일수와 열대야일수(일) 전망(RCP8.5)

	폭염일수				열대야일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	7.9	15.5	30.4	63.6	1.8	8.7	27.9	55.5
충청북도	8.9	14.1	26.8	57.4	0.3	4.5	17.9	39.6
세종특별자치시	10.6	19.1	34.5	69.6	0.9	8.9	27.8	54.1
조치원읍	7.7	16.7	31.3	66.7	0.5	8.1	27.2	53.5
금남면	12.1	21.1	37.6	73.3	1.2	11.1	31.4	58.2
부강면	13.2	22.2	39.4	75.1	1.4	11.3	31.8	58.1
소정면	10.1	19.6	34.4	70.0	0.8	7.1	23.7	49.7
연기면	11.6	20.8	37.1	73.3	1.2	10.8	31.1	57.7
연동면	12.1	21.3	38.0	74.3	1.1	10.9	31.8	58.2
연서면	7.0	15.2	28.9	63.8	0.4	7.1	25.5	52.1
장군면	10.9	19.3	35.0	70.4	1.0	9.9	29.8	56.6
전동면	9.0	17.1	31.3	65.4	0.5	6.4	23.0	48.8
전의면	9.1	16.3	29.7	63.4	0.7	5.1	20.2	45.9
한솔동	12.8	22.3	39.2	75.6	1.4	11.5	32.2	58.8

표 3-6. 세종특별자치시의 폭염일수와 열대야일수(일) 전망(RCP4.5)

	폭염일수				열대야일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	7.9	9.6	17.2	23.7	1.8	5.8	17.1	24.9
충청북도	8.9	9.1	16.1	21.0	0.3	2.7	9.7	14.6
세종특별자치시	10.6	11.4	19.9	26.7	0.9	5.1	17.1	24.1
조치원읍	7.7	9.5	17.2	23.7	0.5	4.4	16.1	23.3
금남면	12.1	12.7	22.0	29.4	1.2	6.5	19.7	27.3
부강면	13.2	13.7	23.4	31.1	1.4	6.8	19.7	27.2
소정면	10.1	12.5	20.7	27.6	0.8	3.8	14.5	20.8
연기면	11.6	12.5	21.6	28.9	1.2	6.5	19.4	27.1
연동면	12.1	12.9	22.2	29.9	1.1	6.7	19.8	27.3
연서면	7.0	8.4	15.5	21.5	0.4	3.7	14.9	21.9
장군면	10.9	11.4	20.1	26.9	1.0	5.7	18.4	25.9
전동면	9.0	10.3	17.8	24.0	0.5	3.3	13.5	19.8
전의면	9.1	9.7	16.9	22.8	0.7	2.4	11.6	17.5
한솔동	12.8	13.6	23.3	30.8	1.4	7.0	20.4	28.1

그림 3-8.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 폭염일수 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))






그림 3-9.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 열대야일수 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))

● 2100년까지 30년 단위 서리일수와 결빙일수의 변화

- 일최저기온은 충청남도 보다 낮고, 충청북도 보다 높으며, 일최고기온은 충청남도와 충청북도 보다 높은 세종특별자치시의 서리일수는 충청남도 보다 많고, 충청북도 보다 적으며, 결빙일수는 충청남도와 충청북도 보다 적음.
- 온실가스 배출추세를 현재 상태로 유지하였을 경우 세종특별자치시의 서리일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 현재보다 46.7일 적게 나타나며, 결빙일수는 13.3일 적게 나타날 것으로 전망됨.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진할 경우 세종특별자치시의 서리일수는 21세기 후반기(2071~2100년)에 현재보다 17.5일 감소할 것으로 전망되고, 결빙일수는 10.2일 감소하여 RCP8.5보다 감소폭이 작아짐.


표 3-7.
세종특별자치시의 서리일수와
결빙일수(일) 전망(RCP8.5)

	서리일수				결빙일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	114.5	106.0	86.0	61.5	14.7	11.0	3.9	0.9
충청북도	133.8	125.1	107.5	83.6	20.4	15.7	6.5	2.2
세종특별자치시	119.2	112.6	95.6	72.5	14.2	10.1	3.7	0.9
조치원읍	120.0	113.7	97.1	73.8	11.6	8.7	3.0	0.7
금남면	111.8	107.0	89.5	66.7	12.4	8.2	2.7	0.5
부강면	113.1	106.3	88.8	65.3	12.1	8.1	2.7	0.6
소정면	127.8	120.0	102.7	78.9	17.3	13.9	5.6	1.5
연기면	115.0	109.4	92.5	69.6	10.8	7.4	2.5	0.5
연동면	114.3	108.4	91.6	68.3	10.6	7.2	2.5	0.5
연서면	120.7	114.1	97.3	74.1	12.6	9.4	3.4	0.8
장군면	115.0	109.3	92.4	69.6	12.9	8.7	2.9	0.6
전동면	127.0	119.3	102.5	79.6	18.1	13.7	5.5	1.5
전의면	130.4	122.0	104.8	81.6	20.3	15.7	6.6	1.9
한솔동	113.5	109.0	92.0	69.3	10.8	7.1	2.3	0.5

표 3-8.
세종특별자치시의 서리일수와
결빙일수(일) 전망(RCP4.5)

	서리일수				결빙일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	114.5	106.6	99.6	92.9	14.7	10.2	7.1	4.2
충청북도	133.8	125.1	119.4	112.7	20.4	14.2	10.9	7.5
세종특별자치시	119.2	113.3	108.0	101.7	14.2	9.7	6.3	4.0
조치원읍	120.0	114.6	109.2	103.1	11.6	8.5	5.3	3.3
금남면	111.8	107.8	102.5	96.4	12.4	7.8	4.8	2.8
부강면	113.1	107.6	102.1	95.6	12.1	7.8	4.8	2.9
소정면	127.8	120.2	114.6	107.9	17.3	13.2	9.5	6.2
연기면	115.0	110.3	105.1	99.0	10.8	7.2	4.3	2.5
연동면	114.3	109.6	104.5	98.3	10.6	7.2	4.3	2.6
연서면	120.7	114.8	109.4	103.2	12.6	9.1	5.7	3.6
장군면	115.0	110.3	105.2	98.9	12.9	8.2	5.2	3.1
전동면	127.0	119.5	114.1	107.8	18.1	12.9	9.2	6.0
전의면	130.4	121.9	116.4	109.9	20.3	14.5	10.8	7.0
한솔동	113.5	109.7	104.5	98.5	10.8	6.9	4.1	2.3

그림 3-10.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 서리일수 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))






그림 3-11.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 결빙일수 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))

● 2100년까지 30년 단위 식물성장가능기간과 여름일수 변화

- 식물성장가능기간과 여름일수는 일평균기온 및 일최고기온을 이용하여 산출되므로, 충청북도보다 일최고기온이 높은 세종특별자치시는 식물성장기간도 더 길게 나타남. 세종특별자치시의 평균기온은 충청남도과 충청북도보다 모두 높으므로 여름일수도 더 많음.
- 온실가스 배출추세를 현재대로 유지하였을 경우(RCP8.5), 세종특별자치시의 식물성장가능기간은 21세기 후반기(2071~2100년) 20% 정도 증가하여 일 년에 55일 정도를 제외하고는 식물생장이 가능하며, 여름일수도 현재 123.5일에서 172.0일 정도로 늘어날 전망이다.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진할 경우 21세기 후반기(2071~2100년) 식물성장가능기간과 여름일수는 각각 15일, 26일 증가(RCP8.5의 각각 30%, 50% 수준)하여 극한기후현상으로 인한 영향을 완화시킬 수 있음.


	식물성장가능기간				여름일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	258.1	267.5	290.8	315.3	114.5	127.4	145.5	165.6
충청북도	248.0	252.0	273.2	299.3	110.4	122.8	141.3	163.7
세종특별자치시	259.1	265.3	285.9	309.7	123.5	135.9	152.6	172.0
조치원읍	259.3	265.1	287.7	310.8	123.6	134.6	152.1	172.3
금남면	261.6	269.8	290.7	313.4	125.6	138.5	154.6	173.6
부강면	262.8	270.3	292.1	314.0	127.8	140.4	156.6	175.0
소정면	254.3	260.2	277.7	305.0	122.9	135.6	152.0	170.9
연기면	262.2	269.5	291.7	313.6	128.0	139.5	156.1	174.9
연동면	262.5	269.7	293.1	314.0	129.2	140.4	157.1	175.7
연서면	258.7	264.5	286.0	309.9	120.9	132.4	149.9	170.6
장군면	260.5	267.5	289.1	312.3	124.6	137.1	153.4	172.7
전동면	254.6	259.0	276.3	303.1	118.6	131.4	148.5	168.6
전의면	251.6	255.8	273.4	301.1	115.8	129.6	146.4	166.7
한솔동	262.3	269.9	291.9	313.7	129.5	141.2	157.3	175.7

표 3-9. 세종특별자치시의 식물성장가능기간과 여름일수(일) 전망(RCP8.5)

	식물성장가능기간				여름일수			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	258.1	262.9	269.7	277.7	114.5	120.8	138.7	142.9
충청북도	248.0	249.5	253.8	261.7	110.4	113.8	131.6	136.9
세종특별자치시	259.1	261.5	266.4	273.7	123.5	128.1	145.9	149.5
조치원읍	259.3	261.8	266.9	274.8	123.6	126.7	145.0	148.8
금남면	261.6	265.9	271.5	277.0	125.6	130.4	148.0	151.6
부강면	262.8	267.1	271.3	276.4	127.8	133.1	150.4	153.7
소정면	254.3	255.2	259.4	269.3	122.9	128.6	146.0	148.8
연기면	262.2	266.2	271.0	276.8	128.0	132.2	149.9	153.0
연동면	262.5	267.2	271.0	276.4	129.2	133.4	151.0	154.0
연서면	258.7	260.9	265.9	273.9	120.9	123.9	142.4	146.6
장군면	260.5	264.0	269.1	276.2	124.6	129.2	147.0	150.3
전동면	254.6	254.0	258.7	268.4	118.6	123.4	141.2	145.1
전의면	251.6	250.9	255.4	265.8	115.8	121.4	138.9	143.2
한솔동	262.3	266.6	271.6	277.6	129.5	134.1	151.5	154.3

표 3-10. 세종특별자치시의 식물성장가능기간과 여름일수(일) 전망(RCP4.5)

그림 3-12.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 식물성장가능기간
 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))






그림 3-13.
세종특별자치시의 읍면동별
RCP4.5(좌)/8.5(우) 여름일수 분포도
(2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
2071~2100년(하))

2) 극한강수지수

● 2100년까지 30년 단위 강수강도와 호우일수 변화

- 세종특별자치시는 충청남도에 비해 강수강도와 호우일수의 증가가 모두 적으나, 충청북도에 비해 강수강도와 호우일수의 증가는 모두 큼.
- RCP8.5의 경우 세종특별자치시의 강수강도는 21세기 후반기(2071~2100년)에 15.1mm/일에서 17.6mm/일로 16.6% 증가하고, 호우일수는 1.6일에서 3.5일로 118.8% 증가함. 강수량 변화(32.6%)에 비해 강수강도 변화는 작으나 호우일수의 변화는 크게 나타남.
- 21세기 후반기(2071~2100년)에 강수강도가 증가하는 비율이 가장 큰 지역은 RCP8.5와 RCP4.5에서 모두 소정면으로 나타났고, 호우일수도 RCP8.5와 RCP4.5에서 모두 소정면이 가장 큰 변화율을 보임.

표 3-11. 세종특별자치시의 강수강도·호우일수 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP8.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	강수강도(mm/일)				호우일수(일)			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	15.1	16.6 +9.9%	18.4 +21.9%	18.6 +23.2%	1.7	2.8 +64.7%	3.8 +123.5%	4.5 +164.7%
충청북도	15.2	15.8 +3.9%	17.5 +15.1%	17 +11.8%	1.8	2.3 +27.8%	3.1 +72.2%	3.5 +94.4%
세종특별자치시	15.1	16.1 +6.6%	17.7 +17.2%	17.6 +16.6%	1.6	2.3 +43.8%	3 +87.5%	3.5 +118.8%
조치원읍	15.3	16.3 +6.5%	18.0 +17.6%	17.8 +16.3%	1.7	2.2 +29.4%	3.1 +82.4%	3.2 +88.2%
금남면	14.3	15.3 +7.0%	16.6 +16.1%	16.4 +14.7%	1.1	1.9 +72.7%	2.2 +100.0%	2.5 +127.3%
부강면	14.8	15.9 +7.4%	17.3 +16.9%	17.0 +14.9%	1.6	2.6 +62.5%	3.1 +93.8%	3.6 +125.0%
소정면	15.4	16.8 +9.1%	18.9 +22.7%	18.7 +21.4%	1.6	2.9 +81.3%	4.2 +162.5%	5.0 +212.5%
연기면	14.9	16.0 +7.4%	17.4 +16.8%	17.4 +16.8%	1.6	2.6 +62.5%	3.3 +106.3%	3.8 +137.5%
연동면	14.9	16.0 +7.4%	17.5 +17.4%	17.3 +16.1%	1.6	2.6 +62.5%	3.2 +100.0%	3.5 +118.8%
연서면	15.4	16.3 +5.8%	18.2 +18.2%	18.2 +18.2%	1.8	2.7 +50.0%	3.6 +100.0%	4.3 +138.9%
장군면	14.8	15.8 +6.8%	17.3 +16.9%	17.2 +16.2%	1.3	2.0 +53.8%	2.5 +92.3%	3.2 +146.2%
전동면	15.2	16.3 +7.2%	18.1 +19.1%	17.7 +16.4%	1.6	2.1 +31.3%	3.1 +93.8%	3.3 +106.3%
전의면	15.4	16.7 +8.4%	18.9 +22.7%	18.5 +20.1%	1.7	2.5 +47.1%	3.5 +105.9%	4.1 +141.2%
한솔동	14.7	15.8 +7.5%	17.2 +17.0%	17.1 +16.3%	1.4	2.2 +57.1%	2.8 +100.0%	3.2 +128.6%

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교


- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우를 온실가스 배출 수준을 현재 추세로 유지하였을 경우와 비교해 보면 아산시 내에서 현재 기후값 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 강수량 증가에 따라 강수강도의 증가율은 더 크나, 호우일수의 변화율은 더 작을 것으로 전망됨.

	강수강도(mm/일)				호우일수(일)			
	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2001~2010	2011~2040	2041~2070	2071~2100
충청남도	15.1	16.9	17.4	19	1.7	2.4	2.6	3.5
		+11.9%	+15.2%	+25.8%		+41.2%	+52.9%	+105.9%
충청북도	15.2	16.5	16.7	18.2	1.8	2.3	2.1	3.1
		+8.6%	+9.9%	+19.7%		+27.8%	+16.7%	+72.2%
세종특별자치시	15.1	16.6	16.8	18.3	1.6	2.2	2.3	2.8
		+9.9%	+11.3%	+21.2%		+37.5%	+43.8%	+75.0%
조치원읍	15.3	17.0	17.1	18.6	1.7	2.7	2.6	3.0
		+11.1%	+11.8%	+21.6%		+58.8%	+52.9%	+76.5%
금남면	14.3	15.2	15.7	16.8	1.1	1.3	1.5	1.7
		+6.3%	+9.8%	+17.5%		+18.2%	+36.4%	+54.5%
부강면	14.8	16.1	16.3	17.7	1.6	2.2	2.1	2.5
		+8.8%	+10.1%	+19.6%		+37.5%	+31.3%	+56.3%
소정면	15.4	17.5	17.7	20.0	1.6	2.9	2.8	4.1
		+13.6%	+14.9%	+29.9%		+81.3%	+75.0%	+156.3%
연기면	14.9	16.3	16.5	17.7	1.6	2.1	2.3	2.5
		+9.4%	+10.7%	+18.8%		+31.3%	+43.8%	+56.3%
연동면	14.9	16.4	16.6	17.8	1.6	2.3	2.3	2.5
		+10.1%	+11.4%	+19.5%		+43.8%	+43.8%	+56.3%
연서면	15.4	17.1	17.1	18.7	1.8	3.0	2.8	3.5
		+11.0%	+11.0%	+21.4%		+66.7%	+55.6%	+94.4%
장군면	14.8	16.1	16.4	17.7	1.3	1.9	2.0	2.4
		+8.8%	+10.8%	+19.6%		+46.2%	+53.8%	+84.6%
전동면	15.2	17.1	17.1	19.0	1.6	2.6	2.2	3.3
		+12.5%	+12.5%	+25.0%		+62.5%	+37.5%	+106.3%
전의면	15.4	17.6	17.5	19.8	1.7	2.9	2.6	4.0
		+14.3%	+13.6%	+28.6%		+70.6%	+52.9%	+135.3%
한솔동	14.7	15.9	16.3	17.3	1.4	1.8	2.1	2.1
		+8.2%	+10.9%	+17.7%		+28.6%	+50.0%	+50.0%

표 3-12. 세종특별자치시의 강수강도 · 호우일수 전망과 현재 기후값 대비 변화율(%) (RCP4.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

그림 3-14.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 강수량도 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))






그림 3-15.
 세종특별자치시의 읍면동별
 RCP4.5(좌)/8.5(우) 호우일수 분포도
 (2011~2040년(상), 2041~2070년(중),
 2071~2100년(하))

제4장

분야별 응용정보

1. 농업(생육도일, 유효적산온도)

● 2100년까지 30년 단위 생육도일과 유효적산온도 변화

- 세종특별자치시의 생육도일과 유효적산온도는 충청남도 및 충청북도 평균보다 조금 높음.
- RCP8.5에서 21세기 전반기(2011~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 10℃ 기준 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 충청남·북도가 약 42%, 세종특별자치시는 약 39%로 전망됨. RCP4.5에서 21세기 전반기(2011~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 생육도일과 유효적산온도의 증가폭은 충청남·북도와 세종특별자치시가 각각 약 18%, 17% 증가하였음.
- 세종특별자치시의 21세기 전반기(2011~2040년) 생육한계온도 10℃ 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,258.4도일, 2,217.2℃로 나타남. 21세기 중반기(2041~2070년)의 생육한계온도 10℃ 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 2,615.0도일, 2,565.4℃로 증가하여 벼, 포도의 재배가 적합함. 21세기 후반기(2071~2100년)의 생육한계온도 10℃ 기준 생육도일과 유효적산온도는 각각 3,136.1도일, 3,080.5℃로 벼, 포도, 수수의 재배가 적합함.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우를 온실가스 배출 수준을 현재 추세로 유지하였을 경우와 비교해 보면 21세기 후반기(2071~2100년)에 생육도일과 유효적산온도의 증가폭이 충청북도와 세종특별자치시 모두에서 약 20% 정도 감소됨.

작물명	생육도일	유효적산온도(Tb=10℃)
벼	-	2,500 ~ 4,000℃ 재배 북한계 2,000℃ 2기작 한계 4,500℃ 3기작 한계 7,000℃
보리	1,270 ~ 1,520도일(Tb=0℃)	800 ~ 1,600℃
밀	1,540 ~ 1,670도일(Tb=0℃) 1,550 ~ 1,680도일(Tb=10℃)	-
감자	-	1,000 ~ 2,200℃
포도	-	2,500 ~ 3,600℃
사과	약 1,300도일(Tb=10℃)	-
수수	-	2,800 ~ 3,400℃
감귤류	-	4,000 ~ 4,500℃

표 4-1.
작물별 유효적산온도 및 생육도일

표 4-2. 우리나라 광역시도별 생육도일(도일)과 유효적산온도(°C) 전망(RCP8.5)

		생육도일			유효적산온도		
		2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	5°C	3442.8	3872.5	4497.4	3393.8	3815.6	4435.8
	10°C	2258.4	2615.0	3136.1	2217.2	2565.4	3080.5
서울특별시	5°C	3394.2	3849.9	4467.2	3321.4	3771.5	4386.1
	10°C	2235.1	2621.3	3141.1	2165.5	2545.9	3058.9
부산광역시	5°C	3660.3	4169.2	4830.3	3611.2	4117.0	4774.9
	10°C	2355.6	2758.9	3311.9	2304.6	2704.6	3256.1
대구광역시	5°C	3419.3	3852.2	4483.4	3359.4	3783.0	4400.3
	10°C	2227.1	2578.7	3104.2	2173.8	2516.3	3027.7
인천광역시	5°C	3025.6	3567.3	4240.9	3051.6	3601.3	4277.9
	10°C	1831.0	2284.2	2832.5	1843.7	2302.7	2853.2
광주광역시	5°C	3637.6	4110.4	4770.2	3552.2	4011.5	4656.4
	10°C	2380.2	2765.3	3311.3	2305.4	2678.1	3209.9
대전광역시	5°C	3448.2	3883.3	4515.0	3402.2	3827.7	4453.7
	10°C	2258.4	2618.7	3145.8	2220.7	2571.0	3090.5
울산광역시	5°C	3357.9	3830.4	4464.1	3302.5	3767.5	4392.4
	10°C	2118.9	2491.7	3013.9	2073.1	2439.3	2953.7
경기도	5°C	3297.6	3752.0	4363.8	3241.7	3690.8	4298.0
	10°C	2141.5	2524.7	3036.9	2089.0	2466.4	2971.2
강원도	5°C	2720.5	3122.2	3666.4	2674.2	3068.1	3601.8
	10°C	1663.6	1992.1	2440.6	1627.7	1949.4	2386.8
충청북도	5°C	3264.0	3686.6	4293.0	3227.4	3641.8	4241.9
	10°C	2111.9	2461.4	2967.4	2082.6	2423.7	2922.0
충청남도	5°C	3368.2	3842.7	4494.7	3325.4	3795.8	4444.5
	10°C	2157.9	2549.2	3085.2	2118.2	2504.7	3036.4
전라북도	5°C	3397.6	3855.0	4494.5	3338.4	3787.5	4420.3
	10°C	2189.7	2564.7	3091.9	2137.9	2504.7	3023.9
전라남도	5°C	3537.6	4056.7	4734.1	3502.1	4013.9	4683.5
	10°C	2242.7	2655.5	3213.0	2209.9	2616.3	3167.0
경상북도	5°C	3172.2	3595.6	4210.8	3128.6	3545.0	4149.3
	10°C	2006.6	2347.6	2856.5	1971.7	2306.1	2804.0
경상남도	5°C	3444.6	3914.3	4549.7	3395.9	3855.7	4481.1
	10°C	2207.5	2582.5	3107.6	2164.5	2530.6	3046.8
제주도	5°C	3741.0	4264.8	4939.8	3685.2	4199.3	4865.9
	10°C	2353.6	2768.4	3331.5	2308.3	2714.2	3269.0

표 4-3. 우리나라 광역시도별 생육도일(도일)과 유효적산온도(°C) 전망(RCP4.5)

	기온	생육도일			유효적산온도		
		2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	5℃	3359.6	3620.6	3787.0	3306.1	3568.6	3732.4
	10℃	2171.4	2410.8	2544.7	2126.6	2367.2	2497.4
서울특별시	5℃	3316.4	3585.8	3756.3	3241.8	3509.5	3680.1
	10℃	2155.6	2404.2	2543.2	2084.9	2332.0	2469.8
부산광역시	5℃	3584.1	3887.7	4076.8	3534.4	3839.0	4027.0
	10℃	2270.6	2539.3	2698.2	2219.4	2488.6	2645.9
대구광역시	5℃	3329.6	3598.2	3762.0	3269.4	3535.6	3696.0
	10℃	2131.6	2376.6	2508.4	2078.7	2322.0	2448.0
인천광역시	5℃	2973.0	3290.3	3461.7	3001.3	3320.3	3494.1
	10℃	1778.7	2059.8	2201.2	1792.7	2075.5	2218.2
광주광역시	5℃	3566.3	3849.3	4028.0	3476.6	3758.1	3931.3
	10℃	2302.9	2556.3	2704.2	2224.1	2476.6	2619.3
대전광역시	5℃	3363.4	3631.5	3796.9	3314.3	3582.3	3744.8
	10℃	2170.3	2416.1	2548.9	2129.7	2375.3	2504.0
울산광역시	5℃	3275.0	3558.9	3744.7	3220.4	3502.4	3685.1
	10℃	2030.9	2281.4	2434.5	1986.0	2235.3	2383.4
경기도	5℃	3223.3	3490.9	3658.4	3165.7	3432.4	3598.6
	10℃	2065.6	2311.2	2446.7	2011.9	2256.7	2389.9
강원도	5℃	2647.8	2897.2	3039.1	2599.4	2847.6	2984.7
	10℃	1593.6	1811.9	1921.7	1556.9	1772.1	1878.9
충청북도	5℃	3184.4	3441.2	3604.3	3144.4	3401.4	3560.9
	10℃	2029.0	2265.1	2393.7	1997.1	2233.0	2357.4
충청남도	5℃	3292.5	3580.2	3752.1	3247.9	3536.6	3707.0
	10℃	2080.4	2337.8	2477.8	2039.1	2296.9	2435.0
전라북도	5℃	3323.6	3603.1	3773.5	3261.7	3541.9	3709.2
	10℃	2112.6	2363.3	2501.5	2058.5	2309.2	2444.1
전라남도	5℃	3472.9	3786.1	3967.8	3434.5	3747.9	3926.9
	10℃	2173.0	2445.2	2594.8	2137.5	2410.3	2557.1
경상북도	5℃	3085.3	3350.8	3512.7	3040.9	3305.8	3464.2
	10℃	1916.9	2156.2	2283.2	1881.7	2120.1	2242.6
경상남도	5℃	3368.1	3653.8	3830.5	3317.3	3602.3	3775.1
	10℃	2125.1	2378.6	2523.6	2080.5	2333.8	2473.9
제주도	5℃	3676.5	3995.4	4180.3	3618.5	3933.4	4116.0
	10℃	2289.6	2560.3	2716.3	2242.0	2510.0	2663.7

2. 보건(열지수, 불쾌지수)

● 2100년까지 30년 단위 열지수와 불쾌지수 변화

- 세종특별자치시의 열지수와 불쾌지수는 충청남·북도 평균보다 약간 높고, 전국적으로도 높은 편에 속함.
- 세종특별자치시의 열지수는 21세기 전반기(2011~2040년)에 '주의' 범위에 속하고, 21세기 후반기(2071~2100년)에 '위험' 범위에 속하게 됨.
- 세종특별자치시의 불쾌지수는 21세기 전반기(2011~2040년)에 '높음' 범위에 속하고, 21세기 중반(2041~2070년)기에 '매우 높음' 범위에 속하게 됨.

표 4-4. 열지수 기준범위

27~32	32~41	41~54	54 이상
경고	주의	위험	매우 위험
27~32도이면, 지속된 노출이나 육체적 활동으로 인한 피로감을 유발할 가능성이 있음.	32~41도에서 지속된 노출이나 육체적 활동은 일상병, 열로 인한 발작, 열로 인한 탈수를 초래할 가능성이 있음.	41~54도이면 일상병, 열경련이나 열로 인한 탈수가 일어나기 쉬우며 지속된 노출이나 육체적 활동은 열로 인한 발작을 유발할 가능성이 높음.	열지수가 54도 이상 되면, 계속된 노출이 일상병이나 열로 인한 발작을 초래할 가능성이 매우 높음.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- 온실가스 감축정책을 적극적으로 추진한 경우를 온실가스 배출수준을 현재 추세로 유지하였을 경우와 비교해 보면 21세기 후반기(2071~2100년)에 열지수와 불쾌지수의 증가폭을 충청북도와 세종특별자치시 모두에서 절반 정도 완화할 수 있음.

68 미만	68~75	75~80	80 이상
낮음	보통	높음	매우 높음

표 4-5.
불쾌지수 기준범위

표 4-6. 우리나라 광역시도별 열지수와 불쾌지수 전망(RCP8.5)

	열지수			불쾌지수		
	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	33.2	37.4	43.8	79.9	82.4	85.7
서울특별시	33.1	37.4	43.6	79.8	82.4	85.6
부산광역시	30.6	34.8	40.8	78.3	81.0	84.2
대구광역시	32.0	36.3	42.9	79.1	81.7	85.2
인천광역시	26.0	29.9	35.8	74.7	77.8	81.5
광주광역시	34.4	38.9	46.0	80.7	83.2	86.6
대전광역시	32.8	36.8	43.1	79.5	82.1	85.4
울산광역시	28.3	32.2	38.0	76.6	79.4	82.7
경기도	31.7	35.9	42.3	78.9	81.5	84.9
강원도	26.1	29.3	34.1	74.5	77.2	80.5
충청북도	31.3	35.2	41.2	78.6	81.1	84.4
충청남도	31.0	35.1	41.4	78.4	81.1	84.5
전라북도	31.9	36.0	42.5	79.0	81.6	84.9
전라남도	30.0	34.2	40.6	77.9	80.6	84.0
경상북도	29.4	33.1	39.0	77.2	79.8	83.2
경상남도	30.7	34.8	41.0	78.2	80.9	84.2
제주도	28.7	32.5	38.2	77.1	79.8	82.9

	열지수			블래지수		
	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	32.0	34.4	36.3	79.2	80.7	81.8
서울특별시	32.0	34.4	36.2	79.1	80.6	81.8
부산광역시	29.4	31.9	33.9	77.5	79.2	80.4
대구광역시	30.9	33.3	35.1	78.4	79.9	81.1
인천광역시	25.1	27.4	29.0	74.0	76.0	77.3
광주광역시	33.2	35.9	38.0	80.0	81.6	82.8
대전광역시	31.6	34.0	35.8	78.8	80.4	81.5
울산광역시	27.3	29.6	31.4	75.9	77.6	78.9
경기도	30.6	33.0	34.8	78.2	79.8	80.9
강원도	25.4	27.0	28.2	73.9	75.4	76.5
충청북도	30.3	32.5	34.2	77.9	79.4	80.6
충청남도	29.9	32.3	34.1	77.7	79.3	80.5
전라북도	30.8	33.2	35.1	78.3	79.9	81.1
전라남도	28.9	31.5	33.4	77.2	79.0	80.2
경상북도	28.4	30.5	32.0	76.5	78.1	79.2
경상남도	29.7	32.1	33.9	77.6	79.2	80.4
제주도	27.9	30.3	32.0	76.6	78.2	79.4

표 4-7. 우리나라 광역시도별 열지수와 블래지수 전망(RCP4.5)

3. 에너지(냉방도일, 난방도일)

● 2100년까지 30년 단위 냉방도일과 난방도일 변화

- 세종특별자치시의 냉방도일은 충청남·북도에 비해 많고, 난방도일은 충청남도에 비해 많으나 충청북도에 비해서는 적음. 냉방도일은 전국적으로도 높은 편에 속해 냉방으로 인한 에너지 소비가 클 것으로 보임.
- RCP8.5에서 21세기 전반기(2011~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 충청북도는 약 260%, 세종특별자치시는 약 230% 증가하고, 난방도일은 충청북도와 세종특별자치시가 유사하여 약 30% 감소하는 것으로 전망됨.
- 월별 냉방도일에서 냉방이 많이 필요한 7월과 8월의 냉방도일은 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 5월과 10월에도 냉방이 필요해짐. 특히 RCP8.5의 경우 21세기 후반기(2071~2100년) 9월 냉방에 필요한 에너지가 현재의 8월 수준보다 큼.
- 냉방도일의 증가율이 난방도일의 감소율보다 크므로 냉방으로 인한 에너지 증가에 대한 대비가 필요할 것으로 보임.

● 온실가스 감축정책 수행여부 비교

- RCP4.5에서 21세기 전반기(2011~2040년) 대비 21세기 후반기(2071~2100년)의 냉방도일은 충청남도는 약 140%, 충청북도는 약 120%, 세종특별자치시는 약 110% 증가하여 온실가스 배출추세를 현재 추세로 유지하였을 경우보다 절반수준으로 늘어남. 난방도일은 충청북도와 세종특별자치시가 유사하여 약 10%만 감소하는 것으로 전망됨.

4장. 분야별 응용정보




그림 4-1.
세종특별자치시의 월별 냉방도일
전망(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))




그림 4-2.
세종특별자치시의 월별 난방도일
전망(RCP4.5(좌), RCP8.5(우))

표 4-8.
우리나라 광역시도별 냉방도일과
난방도일(도일) 전망(RCP8.5)

	냉방도일			난방도일		
	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	157.1	283.5	512.0	2671.1	2295.1	1885.4
서울특별시	147.7	282.2	516.4	2835.1	2430.8	2008.5
부산광역시	134.7	266.4	477.3	2132.4	1765.8	1397.0
대구광역시	142.4	264.1	466.7	2599.8	2230.1	1828.9
인천광역시	19.7	104.3	294.5	2579.0	2129.4	1689.1
광주광역시	171.1	305.0	528.7	2321.4	1950.3	1562.5
대전광역시	159.5	287.6	517.5	2648.8	2270.0	1861.2
울산광역시	96.6	200.1	375.8	2430.0	2055.4	1659.9
경기도	119.3	242.0	459.9	2843.5	2435.8	2013.1
강원도	45.8	111.3	233.0	3446.5	2972.8	2482.3
충청북도	124.1	238.4	443.7	2854.4	2462.0	2039.5
충청남도	113.1	228.0	444.4	2538.2	2143.3	1726.8
전라북도	124.7	243.8	453.6	2563.3	2175.2	1759.0
전라남도	110.5	235.4	445.1	2186.3	1809.7	1420.3
경상북도	92.4	187.3	359.8	2786.5	2393.0	1964.1
경상남도	120.6	239.2	430.7	2421.4	2052.3	1656.9
제주도	112.9	231.0	416.1	1894.5	1544.9	1179.1

	냉방도입			난방도입		
	2011~2040	2041~2070	2071~2100	2011~2040	2041~2070	2071~2100
세종특별자치시	120.9	194.7	255.4	2668.5	2489.2	2379.3
서울특별시	113.4	189.1	253.4	2809.5	2638.4	2524.9
부산광역시	98.2	176.0	240.2	2124.8	1957.1	1846.4
대구광역시	114.0	178.0	231.8	2602.2	2419.3	2313.9
인천광역시	11.7	43.3	77.0	2551.4	2347.7	2226.6
광주광역시	135.1	216.6	282.5	2309.8	2132.8	2026.6
대전광역시	124.1	199.9	259.8	2646.8	2465.4	2356.9
울산광역시	70.2	124.7	178.5	2437.8	2253.1	2138.5
경기도	89.2	156.3	213.0	2819.7	2644.5	2530.4
강원도	34.2	65.3	89.8	3435.4	3200.8	3071.8
충청북도	95.2	159.7	211.6	2849.5	2663.6	2552.5
충청남도	84.5	147.7	201.5	2529.3	2340.9	2227.0
전라북도	95.5	165.0	220.2	2559.4	2366.4	2256.0
전라남도	82.7	155.6	213.1	2179.1	1993.9	1883.7
경상북도	71.2	119.9	162.0	2790.1	2592.1	2476.6
경상남도	92.5	159.6	214.7	2425.5	2239.2	2131.7
제주도	90.1	162.2	216.8	1907.8	1723.3	1616.0

표 4-9. 우리나라 광역시도별 냉방도입과 난방도입(도입) 전망(RCP4.5)

제5장 결론

● 세종특별자치시는 충청남·북도과 비교하여 미래 기온의 증가폭은 비슷하지만, 일평균/최고/최저기온이 높은 편이어서 폭염일수와 열대야일수의 발생일수 증가폭이 더 클 것으로 전망됨. 세종특별자치시 내 읍면동별 기온 차이는 최대 1.2℃로 지역적인 차이가 존재하고, 21세기 후반기(2071~2100년)에는 동일(+4.7℃)하게 기온이 상승할 것으로 전망됨.

- 세종특별자치시 내 읍면동별 일최고기온 차이는 최대 1.1℃, 일최저기온 차이는 최대 1.4℃로 나타나고, 현재 부강면은 폭염 발생이 다른 지역에 비해 많으며, 앞으로도 이 지역의 폭염발생이 가장 빈번할 것으로 전망됨.
- 연서면은 폭염일수와 열대야일수가 적게 나타나며 미래에도 다른 지역에 비해 조금 증가할 것으로 전망됨.

● 세종특별자치시의 강수량 증가율은 충청남도보다 낮고 충청북도보다 높으며, 전국적으로 비교해 중간 수준으로, 미래에 강수량으로 인한 영향이 커질 것으로 예상됨.

- RCP8.5에서 금남면이 세종특별자치시 내에서 가장 큰 강수량 증가율이 나타남.
- 강수강도와 호우일수는 현재 지역적 차이가 크지 않으나 미래에는 소정면에서 강수강도와 호우일수의 증가가 가장 뚜렷해질 것으로 전망됨.

● 기온의 상승으로 21세기 후반기(2071~2100년)로 갈수록 생육도일, 유효적산온도, 불래지수, 열지수, 냉방도일이 증가하고, 난방도일은 감소할 것으로 전망됨.

- 21세기 중반기(2041~2070년)에 세종특별자치시는 벼와 포도의 재배가 적합하고, 21세기 후반기(2071~2100년)에는 벼, 포도, 수수의 재배가 적합할 것으로 전망됨.
- 21세기 전반기(2011~2040년)에 세종특별자치시는 열지수와 불래지수가 각각 '주의', '높음' 범위에 속하고, 21세기 후반기(2071~2100년)에는 열지수와 불래지수가 각각 '위험', '매우 높음' 범위에 속할 것으로 전망됨.
- 냉방도일은 특히 7월~9월에 급격히 증가하고, 냉방이 필요하지 않던 5월과 10월에도 냉방이 필요해짐.

● 온실가스 감축정책을 수행할 경우 세종특별자치시의 21세기 후반기(2071~2100년) 기온상승(+2.1℃)은 온실가스 배출추세를 현재 수준으로 유지하였을 경우에 비해 온도 상승(+4.7℃)이 절반 이하에 그침. 그러나 강수량 증가정도는 온실가스 감축정책 수행여부와 크게 상관없이 증가하고 있음.

- 온실가스 감축으로 인한 효과는 폭염과 열대야와 같은 극한기후에서 더욱 두드러져, 폭염일수는 21세기 후반기(2071~2100년) 59.0일 증가에서 16.1일 증가로 증가폭이 크게 떨어지며, 열대야일수 증가폭도 온실가스 배출을 감소시킬 경우 53.2일에서 23.2일로 증가 속도가 줄어든 것으로 나타남.
- 온실가스 감축은 강수강도와 호우일수 변화에 큰 영향을 미치지 않음.
- 온실가스 감축은 생육도일, 유효적산온도의 변화에 영향을 미쳐 21세기 후반기(2071~2100년)에 충청남·북도와 세종특별자치시에서 증가폭을 약 20% 정도 감소시킬 수 있음. 세종특별자치시의 열지수 증가속도는 약 20%, 불쾌지수의 경우 약 4% 둔화되며, 냉방도일 증가속도는 충청남도에서 140%, 충청북도에서 약 120%, 세종특별자치시에서 약 110% 감소시킬 수 있음. 난방도일의 경우 21세기 후반기(2071~2100년)에 온실가스 감축으로 인해 감소율이 약 10% 줄어드는 효과가 나타남.




그림 5-1. 세종특별자치시의 읍면동별 기후변화 전망 요약

표 5-1.
세종특별자치시의 현재 기후값 대비
21세기 후반기(2071~2100년)의 변화량
(RCP8.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	평균기온 (°C)	최고기온 (°C)	최저기온 (°C)	강수량 (%)	폭염일수 (일)	열대야 (일)	강수강도 (mm/일)	호우일수 (일)
충청남도	+4.8	+4.8	+4.7	+33.8	+55.7	+53.7	+3.5	+2.8
충청북도	+4.7	+4.6	+4.7	+23.5	+48.5	+39.3	+1.8	+1.7
세종특별자치시	+4.7	+4.7	+4.6	+32.6	+59.0	+53.2	+2.5	+1.9
조치원읍	+4.7	+4.6	+4.6	+27.6	+59.1	+53.0	+2.4	+1.5
금남면	+4.7	+4.7	+4.6	+36.7	+61.2	+57.1	+2.0	+1.4
부강면	+4.7	+4.7	+4.7	+27.2	+61.9	+56.7	+2.0	+2.0
소정면	+4.7	+4.7	+4.6	+30.7	+59.9	+48.8	+3.2	+3.4
연기면	+4.7	+4.7	+4.6	+30.9	+61.6	+56.5	+2.3	+2.2
연동면	+4.7	+4.7	+4.6	+29.6	+62.3	+57.1	+2.3	+1.8
연서면	+4.7	+4.6	+4.6	+28.1	+56.8	+51.7	+2.7	+2.6
장군면	+4.7	+4.7	+4.6	+31.7	+59.5	+55.6	+2.2	+1.9
전동면	+4.7	+4.7	+4.6	+26.7	+56.4	+48.2	+2.3	+1.7
전의면	+4.7	+4.7	+4.6	+27.8	+54.4	+45.3	+3.0	+2.4
한솔동	+4.7	+4.7	+4.6	+33.0	+62.7	+57.4	+2.3	+1.8

표 5-2.
세종특별자치시의 현재 기후값 대비
21세기 후반기(2071~2100년)의 변화량
(RCP4.5)

- 현재 기후값은 2001~2010년 평균임

	평균기온 (°C)	최고기온 (°C)	최저기온 (°C)	강수량 (%)	폭염일수 (일)	열대야 (일)	강수강도 (mm/일)	호우일수 (일)
충청남도	+2.2	+2.2	+2.1	+39.6	+15.8	+23.1	+3.9	+1.8
충청북도	+2.1	+2.0	+2.2	+32.1	+12.1	+14.3	+3.0	+1.3
세종특별자치시	+2.1	+2.0	+2.1	+40.2	+16.1	+23.2	+3.2	+1.2
조치원읍	+2.1	+2.0	+2.1	+33.9	+16.1	+22.8	+3.3	+1.3
금남면	+2.1	+2.0	+2.1	+42.7	+17.2	+26.1	+2.4	+0.5
부강면	+2.1	+2.0	+2.1	+36.1	+17.9	+25.8	+2.8	+0.9
소정면	+2.1	+2.0	+2.1	+41.1	+17.5	+20.0	+4.4	+2.2
연기면	+2.1	+2.0	+2.1	+35.1	+17.3	+25.9	+2.7	+0.9
연동면	+2.1	+2.0	+2.1	+35.0	+17.8	+26.2	+2.9	+0.8
연서면	+2.1	+2.0	+2.1	+33.8	+14.5	+21.5	+3.3	+1.7
장군면	+2.1	+2.0	+2.1	+38.3	+16.0	+24.9	+2.8	+1.0
전동면	+2.1	+2.0	+2.1	+37.3	+15.0	+19.3	+3.7	+1.6
전의면	+2.1	+2.0	+2.1	+39.2	+13.7	+16.8	+4.4	+2.4
한솔동	+2.1	+2.0	+2.1	+37.8	+18.0	+26.8	+2.6	+0.8

세종특별자치시 기후변화 상세 분석보고서

◆ 발행일	2013년 11월 30일
◆ 발행처	기상청, 대전지방기상청
◆ 연구기관 (사)환경과문명	정회성 김태용 전병성 문대성 신창호 이윤미 Sophie Bowman
건국대학교	최영은 박창용 권재일 박인홍 이한수
◆ 검수기관	기상청 기후과학국 기후협력서비스팀
◆ 주소	156-720 서울특별시 동작구 여의대방로길 16길 61
◆ 홈페이지	www.kma.go.kr / www.climate.go.kr
◆ 편집·인쇄	문대성



기상청
Korea
Meteorological
Administration